

ренно длинные усики самца, выступающие за основание брюшка, но далеко не достигающие его вершины; удлиненно-грушевидные членики жгутика усиков самца с короткой и неявственно выражено дистальной «шлейкой» и розетками очень длинных вертикально торчащих щетинок в утолщенной проксимальной части; одноцветный прескутум; черпаковидные наружные (нижние) гоностили с рядами шипиков в затемненной дистальной части и шиповидные внутренние ветви гонапофизов самца.

Являясь двойником широко распространенного европейского *O. (s. str.) depilata* (Edwards, 1938), новый вид наглядно отличается от него главным образом строением эдеагуса самца. Внутренние ветви гонапофизов у него в виде очень длинных и стройных, прямых, загнутых в дистальной трети под почти прямым углом на тергальную сторону шипов, тогда как у *O. (s. str.) depilata* — это сравнительно короткие и массивные слегка волнистые шипы с когтевидной вершиной.

Новый вид близок также альпийскому *O. (s. str.) bihamata* (Lackeschewitz, 1935), у которого наружные (нижние) гоностили самца, однако, не черпаковидные, как в группе *depilata*, а в виде узких когтевидно изогнутых стержней с заостренной и затемненной вершиной.

Биотоп нового вида — широколиственный горный лес в поясе около 1800 м н. у. м., распространение еще нуждается в выяснении, скорее всего переднеазиатское, субэндемичное для Армении. Более чем вероятно его обнаружение в смежных с Арменией северных районах Ирана и Турции.

**SUMMARY.** *Dicranota (Rhaphidolabis) ferruginea* Sav., sp. n. (Kirghiz SSR, Issyk-Kul lake shore), *Phyllolabis ghilarovi* Sav., sp. n. (Armenian SSR, Lichk), *Ormosia* (s. str.) *longispina* Sav. sp. n. (Armenian SSR, Megradzor) are described. From allied species they differ in all features of the male hypopygium structure. Type material of described species is preserved in the collection of the Institute of Zoology, Ukrainian Academy of Sciences (Kiev).

*Савченко Е. Н.* *Phyllolabis* O.-S.—новый для СССР род лимониид (Diptera, Limoniidae).—Вестн. зоологии, 1967, № 4, с. 16—21.

*Савченко Е. М.* Два новых вида комарів-лімоніїд (Diptera, Limoniidae) з півдня СРСР.—Доп. АН УРСР. Сер. Б, 1973, № 6, с. 568—571.

*Савченко Е. Н.* Дополнения и исправления к фауне комаров-лимониид (Diptera, Limoniidae) Южных Курил и Южного Сахалина.—Вестн. зоологии, 1979, № 1, с. 23—29.

*Alexander C. P.* New or little-known Tipulidae from eastern Asia (Diptera). XL.—Philipp. Jour. Sci., 1938, 67, p. 129—166.

*Edwards F.* British Short-palped craneflies. Taxonomy of adults.—Trans. Soc. Brit. Entom., 1938, 5, p. 1—168.

*Lackeschewitz P.* Neue Eriopterine aus dem Deutschen Entomologischen Institut.—Overdr. Naturh. Maandbl., 1935, 24, S. 9—14.

*Mannheims B.* Europäische Phyllolabis-Arten.—Bonn. zool. Beitr., 1959, 10, N 1/2, S. 149—156.

*Strobl G.* Die Dipteren von Steiermark, 5. (II. Nachtr., 1909).—Mitt. Naturwissensch. Ver. Steiermark, 1910, 46, S. 45—293.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена  
АН УССР

Поступила в редакцию  
16.IX 1981 г.

УДК 595.799 574

А. З. Осычнюк

## ТРИ НОВЫХ ВИДА АНДРЕН (HYMENOPTERA, ANDRENIDAE) ИЗ КАЗАХСТАНА

В фондовых коллекциях Зоологического института АН СССР (Ленинград) и Зоологического музея МГУ (Москва) обнаружено 3 новых вида рода *Andrena*. Названия двух из них посвящены авторам сборов известным гименоптерологам (ныне покойным) Г. А. Викторову и А. А. Пономаревой.

*Andrena (Taeniandrena) viktorovi* Osytschuk, sp. n.

**Самка.** Длина 12 мм. Голова спереди шире своей высоты. Отросток верхней губы (рис. 1, 1) широкий, короткий, поперечно вдавленный, грубо продольно морщинистый. Хоботок длинный, галеа не пунктированные, нижнечелюстные щупики длиннее галеа больше чем на 2 вершинных членика, язычок узкий, почти в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины;




Рис. 1. Строение новых видов рода *Andrena* (1—3 — *Andrena viktorovi* sp. n.; 4—10 — *Andrena limonii* sp. n.):

1, 4 — отросток верхней губы, ♀; 2, 5 — глазная бороздка, ♀; 3 — последний членик лапки средних ног ♀; 6 — бок 2-го тергита, ♀; 7—1—4-й членики жгутика усика, ♂; 8 — 7-й стернит, ♂; 9 — вершина 8-го стернита, ♂; 10 — генитальный аппарат, ♂.

ны; нижнегубные щупики длиннее язычка больше чем на 1 членик. Наличник широкий, плоский, едва вдавленный посередине, матовый, грубо зернисто шагренированный, более или менее равномерно грубо пунктированный, интервалы между точками равняются обычно 1 диаметру точки, с узкой непунктированной полосой вдоль середины. Глазные бороздки (рис. 1, 2) вверху не четко ограниченные, широкие, занимают почти все расстояние между глазом и боковым глазком; вниз опускаются ниже усиковых ямок, суженные, занимают меньше половины расстояния между глазом и усиковой ямкой. Щит и щитик среднеспинки шагренированные, почти матовые, посередине блестящие, обычно поли-

рованные, пунктировка их довольно грубая и густая, посередине разбросанная, интервалы между точками на шагренированной поверхности местами меньше диаметра точки или равны ему, посередине на полированных участках равны 1—2 и больше диаметрам. Бока среднегруди матовые, морщинисто пунктированные. Срединное поле проподеума большое, четко ограниченное, в основании продольно волнисто-морщинистое, здесь его скульптура грубее скульптуры боковых полей дорсальной поверхности, на боках и на вершине она значительно нежнее. Последний членник лапок всех ног расширенный (рис. 1, 3). Брюшко яйцевидное. Тергиты нежно шагренированные, блестящие; 1-й — в нежных разбросанных точках, интервалы между которыми равны 2 и более диаметрам точки, вершинная часть его перед вершинным краем густо пунктированная, интервалы между точками здесь преимущественно меньше диаметра точки; 2—4-й тергиты гуще пунктированные (пунктировка каждого последующего тергита несколько гуще, но очень разбросанная перед вершинной частью), слабо вдавленные вершинные части их занимают 1/3 длины тергита, на 3—4-м тергитах пунктировка очень нежная, разбросанная, едва заметная. Пигидиальная пластинка с узко закругленной вершиной, едва выпуклое срединное поле не ограничено боковыми бороздками.

Черная. Вершинные членники усиков снизу и последние членники лапок всех ног темно-коричневые. Узкие вершинные края тергитов темно-красновато-коричневые. Крылья прозрачные, светло-дымчатые, стигма и жилки темно-коричневые. Голова в черных коротких волосках, спереди на боках возле усиков в длинных густых серовато-белых волосках с примесью сероватых на висках. Грудь сверху в коротких и довольно редких черных волосках с примесью серовато-белых спереди щита, на боках щитика и заднеспинке; бока среднегруди и проподеум в более густых и длинных, чем на груди сверху, серовато-белых волосках. Ноги в черном опушении, только бедра передних и задних ног в белых волосках и вертлужный пучок белый. Голенная сумка густая из довольно длинных белых волосков и коротких черных по верхнему краю. Тергиты в очень коротких и редких полуприлегающих черных волосках, 1—5-й на боках вершинных частей с пятнами из белых густых волосков, на боках 2—4-го пятна большие, имеют вид широко прерванных посередине перевязей. Аналльная бахромка черная.

Голотип: ♀, Казахстан, Алма-Ата, предгорья Заилийского Алатау, 27.IV 1953 (Викторов). Паратипы: 1♀, с той же этикеткой; 1♀, там же 25.IV 1953 (Викторов). Голотип хранится в коллекции Зоологического музея МГУ (Москва), паратипы — в коллекции Института зоологии АН УССР (Киев).

Вид принадлежит к подроду *Taenianandrena*, самка его ближе всего к самке среднеазиатского вида *Andrena sexguttata* F. M o g (Mogawitz, 1878), от которой отличается размером, более длинным отростком верхней губы, скульптурой тергитов, наличием многочисленных белых волосков в опушении головы и груди, белым вертлужным пучком и голеной сумкой, наличием белых пятен опушения на 1-м тергите и большими белыми пятнами на 2—4-м тергитах, светлыми крыльями.

### *Andrena (Brachyandrena) limonii O sy t s h n j u k, sp. n.*

Самка. Длина 8—8,5 мм. Голова спереди шире своей высоты, с выемчатым теменем. Отросток верхней губы (рис. 1, 4) трапециевидный со слабо вогнутым вершинным краем, поперечно-морщинистый. Хоботок короткий, галеа не пунктированные, язычок вдвое длиннее своей ширины; нижнегубные щупики не длиннее язычка. Наличник выпуклый, блестящий, равномерно густо пунктированный крупными глубокими точками, полированные интервалы между которыми равняются 1/3—1/2 диаметра точки, вдоль середины наличника интервалы между точками

(около 1 диаметра точки) образуют нечеткую полосу; налобник и нижние боковые части лица с почти такой же скульптурой. Глазные бороздки (рис. 1, 5) удалены от внутренней орбиты глаза, длинные, вверху занимают более половины расстояния между глазом и боковым глазком, вниз опускаются ниже усиковых ямок, суженные. Виски несколько уже глаза. Переднеспинка без боковых килей. Щит и щитик среднеспинки блестящие, очень густо и равномерно пунктированные грубыми глубокими точками, полированные интервалы между которыми равны 1/4—1/3 диаметра точки. Бока среднегруди нежно шагренированные, неравномерно и местами разбросанно пунктированные почти такими же грубыми точками. Дорсальная поверхность проподеума с грубой ячеистой скульптурой; срединное поле большое, очень грубо волнисто-ребристое, его горизонтальная часть острым ребром ограничена от вертикальной; скульптура боковых полей дорсальной поверхности несколько нежнее. Нервуллюс переднего крыла от слабо антефуркального до интерстициального. Брюшко яйцевидное, тергиты выпуклые, блестящие, полированные, сплошь очень густо пунктированные грубыми глубокими точками, интервалы между которыми равняются преимущественно 1/2—1/3 диаметра точки; 2-й тергит на боках перед вершиной (рис. 1, 6) с неглубоким матовым вдавлением, пунктированным единичными мелкими точками. Вершинные части 2—4-го тергитов широкие, более или менее вдавленные, пунктировка их нежнее, обычно без непунктированного края; иногда он очень узкий, едва заметный. Пигидиальная пластинка с широко закругленной вершиной, срединное поле его ограничено узкими неглубокими боковыми бороздками.

Черная. Мандибулярные поля, членики лапок всех ног красноватые (первые членики лапок обычно коричневатые). Жгутик усиков снизу, начиная с 4-го членика, коричневато-красный, иногда светлее. Вершинные части тергитов желтовато-красные или темнее, красноватые. У некоторых экземпляров наличник посередине с большим продольным грязно-желтым пятном. Крылья и крыловые крылышки светлокоричневатые, стигма и жилки крыла желтовато-красные. Опущение тела светлое, короткое. Голова в коротких более или менее густых полуприлегающих, на висках в прилегающих, желтовато-белых волосках. Среднеспинка, заднеспинка, бока среднегруди вверху под крыловыми крылышками и частично крыловые крылышки в густых, местами довольно длинных чешуевидных волосках, желтоватых на среднеспинке, белых на остальной поверхности. Бока, низ груди и ноги в беловатых волосках, довольно густых и более длинных на боках среднегруди и проподеума. Вертулочный пучок хорошо развит; голеная сумка сплошь белая, довольно длинная, рыхлая. 1-й тергит брюшка на боках и основании в редких и коротких отстоящих белых волосках; 1—4-й — с широкими вершинными перевязями (ширина их почти равна длине вершинной части тергита) из мелких прилегающих белых волосков: первая из них прерванная посередине, вторая очень суженная, третья слабо суженная, четвертая сплошная. Аналльная бахромка коричневая, прикрыта редкими белыми волосками.

Самец. Длина 6,5—8 мм. Очень похож на самку. Голова спереди значительно шире своей высоты, суженная книзу, глубоко выемчатая на темени. Мандибулы обычные, с внутренним зубцом. Виски едва уже глаз. Наличник почти как у самки. Усики толстые, едва достигают конца щита среднеспинки. 1-й членик жгутика (рис. 1, 7) в 1,5 раза длиннее своей ширины на вершине, едва длиннее 2-го, который одинаковой ширины и длины; 3-й членик длиннее своей ширины. Скульптура груди почти как у самки. Тергиты более выпуклые, чем у самки, 2—4-й — в основании узко слабо вдавленные, вершинные части их едва уже, чем у самки; пунктировка тергитов более редкая, интервалы между точками обычно от 0,5 до 1 диаметра точки, у мелких экземпляров пунктировка нежнее, разбросаннее. 7-й стернит — как на рис. 1, 8. 8-й

(рис. 1, 9) — с прямым вершинным краем. Генитальный аппарат (рис. 1, 10) с развитым дорсальным зубом гонококсита, расширенными вершинами гоностилей, слабо расширенным в основании эдеагусом.

Черный. Наличник желтый. Усики, членники лапок всех ног, вершинные части тергитов, крылья и крыловые крылышки почти как у самки, иногда более или менее темнее, особенно вершинные части тергитов и усики. Тело, как и у самки, в светлом, почти таком же коротком, но более густом опушении. Грудь сверху в простых волосках. 1—4-й тергиты брюшка с вершинными перевязями из густых мелких прилегающих белых волосков, из них три первые более или менее прерванные посередине (первая — наиболее широко), четвертая только суженная; 5-й тергит со сплошной белой вершинной перевязью из более редких волосков. 2—5-й стерниты с узкими вершинными бахромками из редких щетинкообразных волосков.

Голотип: ♀, Волгоградская обл., Тингута, цветы кермека, 13.VIII 1954 (Разумова); Паратипы: 5♀, 3♂ с той же этикеткой, 1♀, там же, 14.VIII 1954 (Разумова); 2♀, Казахстан, Карагандинская обл., южнее Жана-Арка, Коксентир, цветы *Limonium gmelini*, 8.VIII 1959 (Рудольф); 1♀, там же, у соленого озера, цветы те же, 20.VII 1959 и 1♀, 7.VII 1959 (Пономарева). Голотип и часть паратипов хранятся в Зоологическом музее МГУ, остальные паратипы — в Зоологическом институте АН СССР (Ленинград) и в Институте зоологии АН УССР (Киев).

Вид ближе всего к *Andrena colletiformis* F. M. o. g. (Mogawitz, 1873), но самка четко отличается от самки последнего формой отростка верхней губы, формой и скульптурой наличника, более длинными и широкими глазными бороздками, менее грубой скульптурой срединного поля проподеума и тергитов, сплошной пунктировкой вершинных частей тергитов, наличием неглубокого матового вдавления на боках 2-го тергита, густым чешуевидным опушением средне- и заднеспинки, сплошными вершинными перевязями 2—4-го тергитов и др. Самец нового вида четко отличается от самца *A. colletiformis* соотношением длины 1-го и 2-го членников жгутика усиков, строением генитального аппарата (наличием дорсального зуба гонококситов, расширенным в основании эдеагусом и др.), формой 7-го и вершины 8-го стернитов, желтым наличником и др.

#### *Andrena* (? ssp.) *ponomarevae* Osytschnjuk, sp. n.

Самка. Длина 11,5 мм. Голова спереди не шире своей высоты, суженная книзу, с глубоко выемчатым теменем. Отросток верхней губы (рис. 2, 1) очень широкий, его ширина в основании только немногим меньше ширины вершинного края наличника, короткий, почти полукруглый, матовый. Хоботок длинный; галеа короткие, шагренированные, не пунктированные; нижнечелюстные щупики длиннее галеа более чем на 2 вершинных членника; язычок узкий, слабо расширенный в основании, почти в 5 раз длиннее своей ширины; нижнегубные щупики очень длинные, на 3 вершинных членника длиннее язычка. 1-й членник такой же длины, как язычок; два следующих одинаковой длины, каждый равен около 2/3 длины 1-го членника; вершинный — несколько короче. Наличник вытянутый (его высота относится к высоте головы спереди как 5 : 12), плоский с пластинчатым вершинным краем, вдоль середины широко и слабо вдавленный, матовый, сплошь грубо шагренированный, по всей поверхности неравномерно разбросано пунктированный грубыми точками с нечеткой узкой непунктированной полосой вдоль середины. Налобник в густых удлиненных мелких точках. Боковые части лица внизу блестящие, нежно шагренированные, неравномерно густо пунктированные разного размера точками. Глазные бороздки (рис. 2, 2) неравномерно удалены от внутренней орбиты глаза, глубоко вдавленные, особенно

вверху, где они занимают немногим меньше половины расстояния между глазом и боковым глазком, вниз опускаются ниже уровня усиковых ямок, почти не суженные. Виски вверху почти в 1,5 раза шире глаза, блестящие, равномерно густо пунктированные, кроме почти непунктированных вершинных частей; мандибулярные поля слабо развиты, их длина не больше 1/4 ширины основания мандибул. Переднеспинка без боковых




Рис. 2. *Andrena ponotarevae* sp. n.:

1 — отросток верхней губы, ♀; 2 — глазная бороздка, ♀; 3 — 1—4-й членники жгутика усика, ♂; 4 — 7-й стернит, ♂; 5 — 8-й стернит, ♂; 6 — генитальный аппарат, ♂.

килей, блестящая, нежно шагренированная, неравномерно густо пунктированная крупными глубокими точками. Щит и щитик среднеспинки блестящие, сплошь нежно, посередине очень нежно, шагренированные, неравномерно пунктированные разного размера глубокими точками: по краям — мелкими и густыми, ближе к середине — более крупными и разбросанными, посередине — единичными. Бока среднегруди слабо блестящие, шагренированные, в густых более мелких глубоких точках. Проподеум блестящий, нежно шагренированный, дорсальная поверхность его на боках пунктированная почти такими же точками, как бока среднегруди, несколько разбросаннее; срединное поле большое, четко ограниченное, выпуклое, сильно блестящее, более или менее нежно шагренированное только посередине основания, остальная поверхность его полированная. Нервулюс переднего крыла слабо постфуркальный. Внутренние шпоры задних голеней расширенные, последние членники лапок всех ног расширенные. Брюшко удлиненно-овальное. Тергиты выпуклые, блестящие; 1-й — сильно блестящий, на боках и на вершинной части полированный, неравномерно разбросанно пунктированный мелкими точками, интервалы между которыми 1,5—2,3 и больше диаметров точки, вершинная часть его только на боках пунктированная; основные части 2—4-го тергитов густо и грубее пунктированные, причем пунктирка каждого последующего более густая; нежно шагренированные и полированные (перед вершиной частью) интервалы между точками на 4-м тергите посередине преимущественно равны 0,5 диаметра точки;

вершинные части этих тергитов широкие, занимают более 1/3 длины тергита, более или менее вдавленные, сильно блестящие, очень нежно шагренированные, пунктировка их нежнее, чем на основной части, на боках густая и очень разбросанная (на 2-м тергите почти отсутствует) посередине. Пигидиальная пластинка с узко закругленной вершиной, слабо выпуклая, без боковых бороздок, матовая. Стерниты слабо блестящие, густо пунктированные мелкими точками.

Черная. Вершинные края мандибул темно-красные. Жгутик усиков снизу; крыловые крышечки, жилки и стигма крыла темно-коричневые; крылья затемненные, темно-коричневатые. Последние членики лапок и более или менее узкие вершинные края тергитов темно-красновато-коричневые. Опушение тела преимущественно черное, местами белое. Голова спереди на боках, возле усиков и на висках в отстоящих белых волосках. Глазные бороздки в темно-коричневом опушении. Бока среднегруди сверху под крыльями в длинных густых белых волосках, среднеспинка спереди и щитик на боках — в более коротких и редких серовато-белых. Преподеальная корзинка из густых и длинных загнутых вниз перистых белых волосков. Вертлужный пучок хорошо развит, беловато-коричневый. Передние и задние бедра в длинных белых волосках. Голеная сумка короткая (как у представителей подрода *Simandrena*), черная. Трегиты в очень редких и коротких волосках; 1—4-й — на боках вершинных частей с пятнами из густых длинных снежно-белых волосков; ширина их превышает ширину вершинной части; на 1-м тергите пятна округлые, наименьшие; постепенно увеличиваясь, они на 4-м тергите такого размера, как расстояние между ними. Анальная бахромка черная.

**Самец.** Длина 9—9,5 мм. Очень похож на самку. Усики едва достигают основания щитика; 1-й членик жгутика почти втрое длиннее своей ширины на вершине, такой длины, как два следующие вместе взятые; 2-й — почти равной ширины и длины; 3-й — длиннее (рис. 2, 3). 7-й тергит брюшка с узким пигидиальным полем. 7-й и 8-й стерниты — на рис. 2, 4, 5. Генитальный аппарат (рис. 2, 6) с развитым дорсальным зубом гонококсита, со слабо расширенными на вершине геностилями.

Черный, как и самка, но наличник почти сплошь беловато-желтый с двумя черными пятнышками на боках, и обычно такого же цвета маленькие пятнышки внизу на боках лица. Опушение такого же цвета, как у самки, но несколько длиннее. Голова и грудь (на боках и сверху) почти полностью опущены довольно длинными белыми волосками, более длинными на груди; посередине щита более редкое опушение с примесью черных волосков. 1-й тергит брюшка в редких белых волосках, 1—5-й — на боках с большими пятнами из густых длинных белых волосков.

**Голотип:** ♀, Карагандинская обл., южнее Жана-Арка, Коксентир, цветы *Astragalus arbuscula*, 5.VI 1958 (Пономарева). **Паратипы:** 3♂, там же, цветы караганы, 25.V 1958 (Тобиас). Голотип и часть паратипов хранятся в Зоологическом институте АН СССР (Ленинград), часть паратипов — в Институте зоологии АН УССР (Киев).

От почти всех представителей рода *Andrena* отличается очень длинными нижнегубными щупиками, особенно длинным 1-м члеником; по соотношению длины язычка и нижнегубных щупиков ближе всего к *Andrena grossella* Грип. (Grünwaldt, 1976), но у последнего нижнегубные и нижнечелюстные щупики 9-члениковые. Самка нового вида по голеной сумке и преподеальной корзинке близка к самкам видов подрода *Simandrena*.

**SUMMARY.** *Andrena (Taeniandrena) viktorovi* sp. n.— female similar to that of *A. sexguttata* F. M. g. from Caucasus, distinct by longer process of labrum, sculpture of tergites, numerous white hairs in pubescence of head, thorax and legs, pale wings etc. Holotype locality: Kazakh SSR, Alma-Ata, Zailiyskiy Ala-Tau foothills.

*A. (Brachyandrena) limonii* sp. n.—similar to *A. colletiformis* F. M o r., distinct by finer sculpture enclosure of propodeum, female differs by shape and sculpture of clypeus, light impressions on both sides of 2nd tergite, scale-like pubescence on thorax above etc., male differs by structure of genitalia, yellow clypeus etc. Holotype locality: Russian SFSR, Volgograd Region, Tinguta.

*A. (subgenus undeterminate) ponomarevae* sp. n.—from almost all *Andrena* species differs by very long labial palpi, especially of their 1st segment; according to characters of tibial scopa and propodeal corbicula, female is closer to species of *Simandrena*. Holotype locality: Kazakh SSR, Karaganda Region, South of Zhana-Arka, Kokseghir.

Type material is deposited in collections of Zoological Institute Academy of Sciences of the USSR (Leningrad), Zoological Museum of Moscow State University and Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (Kiev).

*Morawitz F. F. Die Bienen Daghestans.*—Hor. Soc. Ent. Ross., 1873, 10, p. 159—160.

*Morawitz F. F. Nachtrag zur Bienenfauna Caucasiens.*—Hor. Soc. Ent. Ross., 1878, 14, p. 68—69.

*Grünwaldt W. Andrena grossella* n. sp., eine Insekten-Art mit 9-gliedrigen Maxillar- und Labialpalpen (Hymenoptera, Apoidea).—Nachricht. Bayer. Entomol., 1976, 25, N 4, p. 65—70.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена  
АН УССР

Поступила в редакцию  
3.III 1982 г.

УДК 595.895.751.4:598.842.2

И. А. Федоренко

## НОВЫЕ ВИДЫ РОДА *PHILOPTERUS* (*MALLOPHAGA, PHILOPTERIDAE*) ОТ КАМЕНОК ФАУНЫ СССР

Пухоеды рода *Philopterus* Nitzsch, 1818—широко распространенные паразиты воробынных. Однако от многих видов воробынных находки пухоедов этого рода до сих пор неизвестны. Так, в каталоге пухоедов мировой фауны (Hopkins, Clay, 1952), пухоедов Северной Америки (Emerson, 1972), в других обзорных работах по указанному роду (Zlotorzycka, Lucinska, 1975, 1976) не отмечен ни один вид *Philopterus* от каменок (род *Oenanthe*). Известна находка *Ph. subflavescens* (Geoffroy) в Таджикистане на обыкновенной каменке и каменке-плясунье (Благовещенский, 1951). Этот вид прежде регистрировался на многих видах воробынных, но сейчас признан сборным. Единственно достоверная находка вида *Philopterus isabellinae* (Mey, 1982) отмечена у каменки-плясуньи из Монголии (Mey, 1982).

Мы располагаем материалом по роду *Philopterus* от пяти видов каменок фауны СССР, в том числе и с каменки-плясуньи. Сравнительно-морфологическое изучение имеющегося материала позволило установить, что на каждом виде каменок паразитирует специфический вид *Philopterus*. Ниже приводим описание всех известных к настоящему времени видов пухоедов рода *Philopterus* от каменок рода *Oenanthe*. Типовые материалы хранятся в коллекции пухоедов Института зоологии АН УССР им. И. И. Шмальгаузена (Киев).

### *Philopterus isabellinae* (Mey, 1982)

Приводится описание по материалу из Туркмении.

Самка. Фон головы и груди бледно-желтоватый, брюшка — бесцветный; полоски и пластинки светло-коричневые. Голова почти одноковой длины и ширины; наибольшая (височная) ширина головы приблизительно в 3 раза превышает ширину переднего прозрачного края; преантеннальная часть с едва вогнутыми боковыми сторонами; клипеус со слегка вогнутым посередине передним прозрачным краем (рис. 1, 1). Виски светло-коричневые, значительно темнее остальной части головы. Клипеальная пластинка с вогнутым посередине передним краем; сама дорсальная пластинка приблизительно одинаковой длины с ее задним отростком, который без четкой склеротизованной светлой оболочки; вентральная пластинка уже дорсальной, с параболическим