

Клоп-слепняк *Eurycolpus flaveolus* Stal. (Heteroptera, Miridae) в европейской части СССР. В июле 1984 г. был найден в Молдавии (г. Сороки), в Курской и Белгородской обл. (Центральный Черноземный государственный заповедник — участки: Баркаловка, Букреевы Барны, Ямская степь); всего собрано около 160 имаго и личинок старшего возраста. Характерным местообитанием *E. flaveolus* Stal. являются каменистые известняковые склоны, где он развивается на зонтичном *Bupleurum falcatum* L. **В. И. Держанский** (Молдавский н.-и. институт табака, Кишинев), **В. Н. Грамма** (Харьковский сельскохозяйственный институт им. В. В. Докучаева).

Новые находки жука-долгоносика *Lixus canescens* F.-W. (Coleoptera, Curculionidae) на юге Украины: 12 ♀, 8 ♂, Запорожская обл., Приморский р-н, Обиточная коса, 25.08.1982 (С. Воловник); ♀, Херсонская обл., Арабатская Стрелка, 12.07.1968; ♂, Донецкая обл., заповедник Хомутовская степь, 1.09.1962 (З. Гершензон); ♀, Донецкая обл.; Новоазовский р-н, Кривая коса, 19.06.1983 (С. Воловник); 3 ♀, 2 ♂, Крым, м. Казантип, 21—22.05.1983 (С. Воловник). На Обиточной косе вид связан с *Crambe pontica* Stev. (определение В. В. Осычнюка), в Крыму — с *C. mitridatis* Juz. (определение О. Н. Дубовик). — **С. В. Воловник** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, Киев).

Cyllodes ater Herbst, 1792 = *Agathidium wankowiczi* Hochhut, 1872 (sec. typ.), syn. n. (Coleoptera, Leiodidae). В коллекции Зоологического музея Института зоологии АН УССР обнаружен синтип-самка *Agathidium wankowiczi*. Экземпляр полностью соответствует оригинальному описанию вида и снабжен этикеткой «*Agathidium wankowiczi* Hochhut К. (киевская губерния)» (рукой Хохгута) (J. Hochhut, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 1872, 45:212). Лектотип обозначен этикеткой из красной бумаги «Lectotypus ♀, *Agathidium wankowiczi* E. Perkovsky design.»; он идентичен хорошо известному *Cyllodes ater* (Nitidulidae). — **Е. Э. Перковский** (Киевский университет).

Новые находки стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) на Украине: *Lathrobium* (s. str.) *flavipes* Hochhut — 47 экз., Херсонская обл., заповедник Аскания-Нова, окр. усадьбы, 13.07.1981, на свет, М. Нестеров. Описан из Восточной Сибири, известен из Куйбышевской обл., окр. Мичуринска Тамбовской обл. и Северного Поволжья. *Xantholinus* (*Heterolinus*) *procerus* Erichson — 11 экз., Закарпатская обл., окр. Виноградова, 20.07.1983, в обрушенной влажной почве обрывистого берега в старице Тисы, А. Петренко. Ранее отмечался в Испании, Италии, на о. Сардиния, в Румынии, Австрии, Венгрии, ГДР, ФРГ, Чехословакии, Польше, в СССР — в Ленинградской обл. и на Кавказе. — **А. А. Петренко** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, Киев).

Z. ogochrus ibericus Franz, 1967 = *Z. ponticus* Dolin, 1977, syn. n. (Coleoptera, Elateridae). Сравнение типового материала, любезно предоставленного д-ром Шенманом (H. Schönmann, Naturhistorisches Museum Wien), позволило установить синонимию *Z. ponticus* Dolin (В. Г. Долин — в сб.: Новые и малоизвестные виды насекомых Европейской части СССР. Л.: ЗИН, 1977 — с. 21; типовая местность: Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное) и *Z. ibericus* Franz (Entomol. Bl. 63, 1967: 34; типовая местность: «Seo de Urgel», южн. склон Ц. Пиренеев, Испания). Ареал этого вида охватывает Южную и Среднюю Европу (Испания, Франция, Италия, Болгария, Венгрия), Крым и Закавказье. — **В. Г. Долин** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР).

Редкие виды жужелиц (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины. *Cymindis kiritschenko* Kryzh. et Metz. выявлен в плакорной степи заповедника Аскания-Нова 5.09.1981. До настоящего времени был известен только с Керченского п-ова (♀, Керчь, 1907).