

- Конаков Н. П. Методика и техника количественного учета энтомофауны травяного покрова // *Вопр. экологии и биоценологии*.— 1938.— Вып. 4.— С. 5—24.
- Конаков Н., Онисимова З. Биоценометр для учета фауны насекомых травяного покрова // *Защита растений*.— 1936.— № 9.— С. 125—127.
- Медведев Л. Н. К методике определения абсолютной численности беспозвоночных // *Биогеоценологические исследования в широколиственно-еловых лесах*.— М.: Наука, 1971.— С. 325—332.
- Миноранский В. А., Обут Л. М., Чудаков С. Н., Фомичев А. И. О методе энтомологического кошения сачком // *Структура и функционально-биогеоценологическая роль животного населения суши: Материалы совещ.* 23—24 февр. 1967 г.— М., 1967.— С. 144—148.
- Палий В. Ф. Новый тип сачка для сбора и исследования энтомофауны травостоя // *Тр. н.-и. ин-та биологии Харьк. ун-та*.— 1953.— 18.— С. 195—199.
- Палий В. Ф. Разработка методики кошения сачком как способы учета мелких видов энтомофауны травостоя // *Сб. энтомол. работ АН Кирг.ССР*.— 1962.— Вып. I.— С. 55—61.
- Палий В. Ф., Гайворонская В. И. Испытание различных типов сачков для сбора насекомых // *Там же*.— 1963.— Вып. 2.— С. 92—99.
- Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях.— М.: Наука, 1982.— 287 с.
- Прыткая ящерица: Монографическое описание вида / Отв. ред. А. В. Яблоков.— М.: Наука, 1976.— 374 с.
- Станчинский В. В. К методике количественного изучения биоценозов травянистых ассоциаций // *Журн. экологии и биоценологии*.— 1931.— 1, № 1.— С. 133—137.
- Тертышников М. Ф. Экологический анализ и биоценологическое значение популяций прыткой ящерицы (*Lacerta agilis exigua* Eichw., 1831) и разноцветной ящурки (*Eremias arguta deserti* Gmel., 1789) в условиях Ставропольской возвышенности: Автореф. дис. ... канд. биол. наук.— Киев, 1972.— 30 с.
- Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных.— М.: Высш. шк., 1971.— 424 с.
- Чернов Ю. И., Руденская Л. В. Об использовании энтомологического кошения как метода количественного учета беспозвоночных — обитателей травяного покрова // *Зоол. журн.*— 1970.— 49, вып. 1.— С. 137—144.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
АН УССР (Киев)

Получено 30.01.85

ЗАМЕТКИ

Новые для фауны Киргизии комары-лимонииды (Diptera, Limoniidae).— И. Г. Плющом и С. Н. Рыбиным впервые обнаружены в региональной фауне: Фрунзенская обл.— **Dicranota* (s. str.) *guerini* Ztt., *Ormosia* (s. str.) *helifera* Sav., *Antocha* (s. str.) *scapularis* Al., Иссык-Кульская обл.— *Dactylolapis* (s. str.) *opaca* Sav., **Symplecta* (s. str.) *chosenensis* Al., **Ilisia* (*Parilisia*) *yezoana* (Al.), *Gonomyia* (s. str.) *sexlobata* Sav., *Dicranomyia* (s. str.) *tessulata* Sav., **D.* (s. str.) *ventralis* (Schumm.), *D.* (*Sphaeropyga*) *retrograda* (Al.), **Metalimnobia* *quadrinotata* (Mg.); Ошская обл.— **Pseudolimnophila* *sepium* (Verr.) (?ssp.), *Erioptera* (s. str.) *cervina* Sav. in litt., *E.* (*Mesocyphona*) *conica* Sav., *Eriocnopa* *tadzica* Sav., **Ilisia* (s. str.) *asymmetrica* (Al.), *I.* (s. str.) *parchomenkoi* Sav., **Ilisia* (*Parilisia*) *sparsiguttula* (Al.), **Idiocera* (s. str.) *pulchripennis* Lw. За исключением отмеченных звездочкой, все упомянутые виды являются ореофилами, эндемичными или субэндемичными для горных районов Средней Азии. *Dicranomyia* (*Sphaeropyga*) *retrograda*, который до сих пор был известен лишь по самцу-голотипу из Центрального Китая, возможно, идентичен *D.* (*S.*) *stenopyga* (Al.), описанному из Северной Америки, но широко распространенному также на востоке Палеарктики от Камчатки на севере до Монголии на юге.— Е. Н. Савченко (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, Киев).

Esperarge Nekrutenko (Lepidoptera, Satyridae), nom. n. pro *Esperella* Nekrutenko, 1987 (*Вестн. зоол.*, № 3: 62) (Lepidoptera, Satyridae), non G. Vosmaer, 1885 (in Bronn H. Klassen und Ordnungen des Tierreichs, Bd. 2, H. 1: 353, 354) (*Spongia*, *Monaxonida*). Выражается признательность А. В. Янковскому, обнаружившему омонимию.— Ю. П. Некрутенко (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, Киев).