

УДК 595.142.3

В. В. Иванцов

ЩЕТИНКОВЫЙ АППАРАТ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAEAE, LUMBRICIDAE) И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ТАКСОНОВ ВИДОВОЙ ГРУППЫ

В статье рассматривается вопрос о методике использования особенностей строения щетинкового аппарата для определения лямбрицид. У дождевых червей сем. Lumbricidae на каждом сегменте находится 8 щетинок, расположенных попарно. Вследствие этого на теле червей образуется 8 продольных рядов щетинковых линий. У различных видов расстояние между рядами неодинаковое. Эти ряды на каждой стороне тела обозначаются «*a*», «*b*», «*c*», «*d*» (рисунок) от брюшной стороны. Промежутки между щетинками обозначают соответственно: «*aa*» — между правой и левой брюшными; «*ab*», «*bc*», «*cd*» и «*dd*» — между правой и левой спинными. В настоящее время в отечественных и зарубежных работах отсутствует единый критерий оценки их размещения в сегментах, и, в частности, предлагаются несколько вариантов:

I. Щетинки сильно сближены (расстояние «*ab*» и «*cd*» много меньше, чем «*bc*» (рисунок, *A*); щетинки слабо сближены (расстояние «*ab*», и «*cd*» много меньше, чем «*bc*» (рисунок, *B*); щетинки вовсе не сближены (расстояние между щетинками, кроме спинного, более или менее одинаковы (рисунок, *B*) (Малевич, 1950; Plisko, 1973).

II. Щетинки можно считать сильно сближенными в том случае, если «*ab*» и «*cd*», по крайней мере, в 4 раза меньше «*bc*» — Перель, 1979.

III. В немногих работах (Малевич, 1950; Квавадзе, 1985; Cernosvitov, 1935) исследователи производят описание щетинкового аппарата отдельных лямбрицид с использованием цифровых выражений этих расстояний в виде формулы $aa : ab : bc : cd : dd$.

Определение расстояний между щетинками по методикам И. И. Малевича (1950), Т. С. Перель (1979) производится под бинокуляром, с помощью окуляр-микрометра. Во многих работах численное выражение указанной формулы носит произвольный характер. У одних авторов эти величины представлены дробными числами: $4 : 1 : 3 \frac{1}{2} : 2$

$\frac{3}{4} : 16$ *Lumbricus terrestris* (Малевич, 1950); другие оперируют целыми одно-, двух-, трехзначными числами: $40 : 6 : 33 : 5 : 120$ — *L. rubellus* (Квавадзе, 1985). Произвольный выбор чисел не дает возможности оперативно производить идентификацию видов. Кроме этого, точность измерений неодинакова. Большинство исследователей не указывают части тела, где были произведены измерения. А ведь у многих видов сем. Lumbricidae наблюдается изменение топографии щетинкового аппарата на протяжении всей длины




Схема расположения щетинкового аппарата:

A — щетинки сильно сближены попарно; *B* — щетинки слабо сближены попарно; *C* — щетинки не сближены попарно.

тела. Довольно ощутимое изменение расстояния между щетинками мы наблюдали в послепоясовой части тела. Наиболее часто изменяется размещение щетинок «*b*», «*c*», «*d*».

Мы предлагаем унифицировать сбор первичного материала так, чтобы он имел максимум однородности. По нашему мнению, такими сегментами могут служить 4—6-й, ибо они менее всего подвержены изменчивости. При сравнении поперечных срезов различных частей тела было отмечено, что до 14—15-го сегментов они на срезе имеют вид правильного круга. Остальные сегменты тела на срезе отличны от геометрического круга. У разных видов, особенно послепоясовой части тела, сегменты на срезе овальные, пятигранные, уплощенные. Мы предлагаем две методики оценки топографии щетинкового аппарата.

Первая — использовать градусную сетку. Для этого необходимо отпрепарировать 4—6-й сегменты. После произвести их зарисовку. Ее выполняют с помощью рисовального аппарата Аббе. При зарисовке особое внимание необходимо уделить размещению щетинок в сегменте. Циркулем находится центр и от него проводятся радиусы. Углы между щетинками определяются транспортиром ТГ-А (транспортир топографический). Данная методика оценки топографии щетинкового аппарата дает высокую степень точности. Однако не всегда 4—6-й сегменты имеют правильную форму круга. В тех случаях, когда обрабатывается материал, длительное время хранившийся в спиртовых фиксаторах, он довольно часто подвержен деформации и использовать рекомендуемую выше методику не представляется возможным.

Вторая методика. Мы предлагаем усовершенствовать методику И. И. Малевича (1950). На наш взгляд, использование методики И. И. Малевича вызывает трудности в работе и значительные погрешности в измерении окуляр-микрометром круга, на котором размещены щетинки. Расстояние между щетинками можно определять по рисунку курвиметром КУ-А. Несмотря на то, что при этой методике получаются достоверные данные, они не могут быть использованы для сравнения с данными других авторов. Здесь существенную роль будут играть номиналы объектива и окуляра, длина штанги рисовального аппарата, расстояние от зеркала до рисовального столика и размеры самого объекта. Чтобы исключить влияние данных факторов, достаточно полученные результаты измерений расстояния между щетинками суммировать и принять за 100 частей, тогда как каждая величина измерения будет представлена соответственной частью. Предлагаемые методики дают возможность использовать щетинковый аппарат для достоверного определения лямбрицид. Они в соответствующей модификации могут быть успешно использованы и при таксономических работах с олигохетами других семейств.

Кавадзе Э. Ш. Дождевые черви (*Lumbricidae*) Кавказа.— Тбилиси : Мецниереба, 1985.— 235 с.

Малевич И. И. Собрание и изучение дождевых червей — почвообразователей.— М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950.— 39 с.

Перель Т. С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей фауны СССР.— М. : Наука, 1979.— 272 с.

Cernosvitov L. Monographie de tschechoslovakischen Lumbriciden // Archiv pro přírodovedecký vyznam czech.— 1935.— 19. č. 1.— 86 s.

Plisko J. D. Lumbricidae Dzdzownice (Annelida: Oligochaeta) // Fauna Polski— Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1973.— 155 s.

Луцкий пединститут им. Л. Украинки

Получено 08.06.87