этой группы новый вид хорошо отличается широкими, заметно уплощенными надкрыльями с сильно вдавленным основанием, широко уплощенным и отогнутым боковым кантом надкрылий, резкой бороздкой на передних голенях, сильно сглаженной микроскульптурой, строением гениталий. От видов группы *D. (Duvalidius) microphthalmus* (Hůrka, Pulpan, 1980) отличается отчетливыми наружными бороздками надкрылий, отсутствием склеротизованных пластин во внутреннем мешке эдеагуса, полностью редуцированными глазами. От представителей группы *D. (Duvalidius) procerus* (Hůrka, Smetana, 1967) отличается опушенными висками и уже упомянутыми признаками. Резкие отличия в форме тела, строении гениталий и т. д. наблюдаются и от слепого венгерского *D. (Typhloduvalius) gebhardti* (Bokor).

Экологические замечания. Новый вид собран в заброшенной угольной шахте, не используемой около 50 лет, Шахта горизонтальная, расположена на склоне горы приблизительно в 50 м. от её основания по вертикали, среди букового леса. Жуки найдены в почве возле трухлявых деревянных опор. Совместно с ними встречались *Duvalius subterraneus* (Mill.), пауки, ногохвостки, комары.

Hůrka K., Smetana A. Revision der karpathischen Artengruppe von Duvalius (Duvalidius) procerus Putz. (Ein Beitrag zur kenntnis der Koleopteren der Karpaten) // Acta entomol. Mus. nat. Pragae.— 1967.— **37**.— S. 577—605.

Hůrka K., Pulpan J. Revision der Arten-Gruppe Duvalius (Duvalidius) microphthalmus (Col., Carabidae) // Acta Univ. Carolinae.— 1980.— **12**.— S. 297—355.

Jeannel R. Monographie des Trechinae. Morphologie comparee et distribution geographique d'un groupe de Coleopteres. (3e Livraison).— L'Abeille.— 1928.— **35**.— 808 p.

Pawłowski J. Revision du genre Trechus Clairv. (Coleoptera, Carabidae) du Proche Orient // Acta zool. cracov.— 1979.— **23**, N 11.— P. 247—476.

Иркутский государственный университет
Государственный природоведческий музей АН УССР (Львов)

Получено 11.09.87

A New Species of the Genus Duvalius (Coleoptera, Carabidae) from Transcarpathian Area. Shilenkov V. G., Rizun V. B.— Vestn. zool., 1989, No. 4.— *Duvalius (Duvaliotes) transcarpathicus* Shilenkov et Rizun, sp. n. is described from Tyachev region, Transcarpathian distr., Ukraine. Type material has been collected in an abandoned horizontal coal mine within a hill slope of Southern spurs of the Krasna range. Type material is deposited in collections of the Institute of Zoology (Kiev, including holotype) and in the State Natural History Museum in Lvov.

ЗАМЕТКИ

Новое место находки Knipowitschia georghievi Pinchuk (Pisces, Gobiidae).— 2 ♀, L=30,7—31,0, l=24,5—24,6 мм, канал Днепр — Донбасс, 18 км от Днепродзержинского вдхр. 19.04. 1987 (Н. В. Коваль, П. Г. Шевченко, В. Н. Колесников). Оба экземпляра любезно переданы в лабораторию ихтиологии Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР (инв. № 3542). Ранее этот вид отмечался В. И. Пинчуком в оз. Гебеджинском (НРБ) и в Днестровском лимане; в Днепре до района Берислава. Вероятно, вид распространился вверх по течению Днепра до Днепродзержинского вдхр., в связи с зарегулированием стока реки.— **А. И. Смирнов** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР).

Гигантская вечерница в Окском заповеднике.— 2 самки — взрослая с признаками недавней лактации и молодая — были найдены в колонии рыжей вечерницы в дупле осины в юго-восточной части заповедника 13.08.1987. Взрослая самка находилась в состоянии линьки; ее размеры (мм): длина тела 93,4, длина хвоста 62,0, длина головы (от переднего края альвеолы внутреннего резца до наиболее выдающейся назад точки затылочного отдела) — 22,4, длина предплечья 65,3, длина уха 26,0, длина козелка 7,2, длина верхнего ряда зубов 9,4; размеры молодой самки соответственно 82,3, 54,9, 21,7, 58,5, 20,8, 6,4 и 8,6.— **Е. Ю. Иванчева, В. П. Иванчев** (Окский биосферный государственный заповедник).