

- Вехов Н. В.* Биология массовых видов ветвистоусых и веслоногих ракообразных в связи с антропогенным воздействием на тундровые водоемы: Автореф. дис. ... канд. биол. наук.— М., 1979.— 18 с.
- Вехов Н. В.* Биология веслоногих ракообразных тундровых водоемов. 2. Временные водоемы // Биол. науки.— 1980.— № 2.— С. 44—50.
- Вехов Н. В.* Fauna и особенности жизненных циклов веслоногих ракообразных подотрядов Cyclopoida и Calanoida арктических и субарктических водоемов Европы // Гидробиол. журн.— 1982.— 18, № 2.— С. 18—25.
- Вехов Н. В.* Видовой состав низших ракообразных водоемов Полярного Урала // Биол. ресурсы водоемов Урала, их охрана и рациональное использование. Второе региональное совещ. гидробиологов Урала: Тез докл.— Пермь, 1983.— Ч. 1.— С. 20—22.
- Елина Г. А., Лебедева Р. М.* Голоценовая динамика ландшафтных зон северо-запада Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене // Наука, 1982.— С. 148—154.
- Зверева О. С.* Особенности биологии главных рек Кomi АССР в связи с историей их формирования.— Л.: Наука, 1969.— 279 с.
- Никифорова Л. Д.* Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене.— М.: Наука, 1982.— С. 154—162.
- Покровская Т. Н.* Некоторые особенности продуцирования и накопления органического вещества в озерах северных ландшафттов // Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах.— Новосибирск: Наука, 1975.— С. 90—95.
- Последний ледниковый покров Европы.— М.: Наука, 1977.— 141 с.
- Пырина И. Л., Гецен М. В., Вайнштейн М. Б.* Первичная продукция фитопланктона озер Харбейской системы Большеземельской тундры // Продуктивность озер восточной части Большеземельской тундры.— Л.: Наука, 1976.— С. 63—76.
- Рылов В. М.* Пресноводные Calanoida СССР.— Л.: Главнаука, 1930.— 288 с.
- Филимонова З. И.* Низшие ракообразные планктона озер Карелии. Беспозвоночные.— М.; Л.: Наука, 1965.— С. 111—146.
- Ekman S.* Die Phyllopoden, Cladoceren und freilebenden Copepoden der Nordschwedischen Hochgebirge // Zool. J. Abstract für Systematik.— 1904.— 21.— S. 1—170.
- Kiefer F.* Friebelenden Copepoda.— Binnengewässer, 1978.— Bd. 26, teil 2.— 343 S.
- Nauwerck A.* Die verbreitung der Familie Diaptomidae Sars in Nordschweden // Arch. Hydrobiol.— 1980.— 89, N 1/2.— S. 247—264.
- Smirnov S. S.* Über einige bemerkenswerte Copepoden aus dem Nordural // Zool. Anz.— 1930.— 87, N 7/8.— S. 159—170.

Всесоюзный НИИ охраны природы  
и заповедного дела Госкомприроды СССР (Москва)

Получено 06.01.86

УДК 594.3(477.8)

А. А. Байдашников

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Вертикальная поясность наземной малакофауны более или менее совпадает с вертикальной зональностью растительности. В Карпатах выделяют (Шеляг-Сосонко, Андриенко, 1985) следующие растительные пояса: предгорный пояс (450—550 м) с лесами из дуба обыкновенного и (местами) скального; нижний лесной пояс (до 1200—1300 м) с лесами из буков, пищты (в Закарпатье даже с чистыми бучинами) и выше ели; верхний лесной пояс (до 1500—1600 м) с еловыми лесами; субальпийский пояс (до 1800 м) с кустарниками ольхи зеленой, сосны горной и можжевельника сибирского; пояс альпийских лугов (выше 1800 м). В эту схему мы вложили собственные материалы, полученные на основании изучения наземной малакофауны Украинских Карпат и прилегающих территорий Закарпатья и Прикарпатья в 1982—1983 и 1985—1986 гг. (табл. 1). Литературные данные по вертикальному распределению наземной малакофауны этого региона весьма неполны (Bakowski, 1885).

Лесной тип растительности является основным в Карпатах. Поэтому подавляющее большинство моллюсков, населяющих коренные и условно коренные фитоценозы\*, составляют обитатели лесов. Кальце-

\* Вторичные растительные формирования населяют синантропы и виды, распространившиеся из-за образования искусственных редколесий и безлесных площадей (Байдашников, 1985).

фильные скалоложилы, обитающие исключительно на сухих безлесных участках известняковых утесов (*Pupilla sterri*, *Truncatellina cylindrica*, *Granaria frumentum*, *Chondrina avenacea*, *Pyramidula rupestris*, *Clausilia dubia* \*), встречаются редко и отмечены лишь в некоторых пунктах нижнего и верхнего лесного пояса. В целом они не характерны для малакофауны Украинских Карпат и не проявляют определенной вертикальной приуроченности.

Растительность альпийских лугов за несколько столетий хозяйственной эксплуатации испытала значительные антропические перегрузки и почти лишина наземных моллюсков.

Карпатскую лесную малакофауну составляют, главным образом, эндемики Карпат, среднеевропейские горные и европейские лесные моллюски. С высотой роль эндемиков в малакокомплексах возрастает, и наоборот, в предгорьях увеличивается участие некоторых европейских лесных моллюсков, палеарктических и голарктических видов, которые выше в горах встречаются редко или отсутствуют совсем (табл. 1).

Черты вертикальной поясности карпатской малакофауны придает широкий набор моллюсков с определенной вертикальной приуроченностью. Вместе с тем от предгорий до субальпийского пояса распространены интерзональные виды и подвиды (табл. 1: № 21, 28, 30, 31, 41, 43, 53, 66, 68, 77, 83), которые сглаживают черты вертикальной поясности. Однако они составляют незначительную часть малакофауны. Малакокомплексы предгорных лесов с примесью ясения и ольхи клейкой, произрастающих во влажных и плохо дренируемых понижениях, отличаются наличием следующих видов: № 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 44, 52, 60, 69, 71, 75, 78 (табл. 1), которые в горных лесах уже не обитают или проникают только во влажные фитоценозы горных долин. Эти же моллюски встречаются в равнинных лесах (равнинные виды). Малакокомплексы предгорных лесов других типов (закарпатские скальнодубовые и прикарпатские буково-дубовые) имеют уже черты горнокарпатской фауны, но включают ряд видов, тяготеющих в вертикальном распространении к предгорьям (табл. 1: № 6, 14, 24, 26, 56, 73, а для Закарпатья также 16, 32, 84). Их популяции нередко встречаются и выше — в лесах нижнего лесного пояса. Вертикальная приуроченность отдельных видов, как и вообще вертикальная поясность карпатской малакофауны, не имеет четких границ (см. дальше), и некоторые моллюски, характерные для предгорий, местами проникают также в выше расположенные леса. Кроме того, вырубка лесов и высокие антропические нагрузки привели к исчезновению некоторых из этих моллюсков во многих местах предгорной зоны. Теперь они стали там редкими, и их разрозненные популяции чаще можно обнаружить в выше расположенных лесах, где меньше хозяйственная деятельность человека.

Для нижнего лесного пояса не отмечено свойственных только ему видов. Здесь распространено множество моллюсков, общих с предгорной зоной (см. табл. 1). Многие из них повсеместно встречаются в широколиственных и смешанных (елово-пихтово-буковых) лесах нижнего пояса, подымаясь до ельников. Однако часть этих общих с предгорьями моллюсков (табл. 1: № 7, 40, 55, 62, 76, 85) распространена только в полосе широколиственных лесов. Малакокомплексы смешанных лесов еще включают виды, общие с ельниками, которые можно назвать полувысокогорными (табл. 1: № 15, 47, 54, 74, 81). К ним близки по своему вертикальному распространению boreальные виды (табл. 1: № 13, 39). Через леса нижнего пояса до ельников протягиваются в виде узких полос вдоль многочисленных горных рек и потоков фитоценозы горных долин — сероольшаники и заросли подбела судетского, которые населяют влаголюбивые малакокомплексы. Они образованы моллюсками с

\* *Clausilia dubia*, в отличие от других видов этого малакокомплекса, иногда встречается в лесных условиях.

Таблица 1. Вертикальное распределение наземных моллюсков Карпат

Виды и подвиды	Леса юго-западного макроп склона				Растительность субальпийского пояса		Леса северо-восточного макроп склона			
	предгорья Закарпатья	нижний пояс	верхний пояс	предгорья Прикарпатья	верхний пояс	нижний пояс	предгорья Прикарпатья	верхний пояс	нижний пояс	предгорья Прикарпатья
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. <i>Acicula parcelineata</i>										
2. <i>A. polita</i>										
3. <i>Carychium minimum</i>										
4. <i>C. tridentatum elongatum</i>										
5. <i>Cochlicopa lubrica</i>										
6. <i>Sphyrapodium doliolum</i>										
7. <i>Argna bielzii</i>					?					
8. <i>Acanthinula aculeata</i>										
9. <i>Vertigo substriata</i>										
10. <i>V. pusilla</i>										
11. <i>V. modesta alpestris</i>										
12. <i>Columella edentula</i>										
13. <i>C. columella</i>										
14. <i>Merdigera obscura</i>										
15. <i>Ena montana</i>										
16. <i>Chondrula bielzii</i>										
17. * <i>Serrulina serrulata</i>										
18. <i>Cochlodina orthostoma</i>										
19. <i>C. laminata</i>										
20. <i>Ruthenica filograna</i>										
21. <i>Macrogaster tumida</i>										
22. <i>M. latestriata latestriata</i>										
23. <i>Clausilia cruciata</i>										
24. <i>C. pumila pumila</i>										
25. <i>C. dubia</i>										
26. <i>Laciniaria plicata</i>										
27. <i>Pseudalinda fallax</i>										
28. <i>P. stabilis</i>										
29. <i>Vestia elata</i>										
30. <i>V. gulo</i>										
31. <i>V. turgida turgida</i>										
32. <i>V. turgida procera</i>										
33. * <i>V. turgida elongata</i>										
34. <i>Bulgarica cana</i>										
35. <i>Succinea putris</i>										
36. <i>Succinella oblonga</i>										
37. <i>Oxyloma elegans</i>										
38. <i>Punctum pygmaeum</i>										
39. * <i>Discus ruderatus</i>										
40. <i>D. perspectivus</i>										
41. <i>Arion subfuscus</i>										
42. <i>A. silvaticus</i>										
43. <i>Euconulus fulvus</i>										
44. <i>Vitrina pellucida</i>										
45. <i>Semilimax semilimax</i>										
46. <i>S. Kotulai</i>										
47. <i>Eucobresia nivalis</i>										
48. <i>Vitrea diaphana diaphana</i>										
49. * <i>V. diaphana erjaveci</i>										
50. <i>V. transsylvanica</i>										
51. <i>V. crystallina</i>										
52. <i>Nesovitrea hammonis</i>										
53. <i>Aegopinella pura</i>										
54. <i>A. nitens</i>										
55. <i>A. epipedostoma juncta</i>										
56. <i>Oxychilus glaber striarius</i>										
57. <i>O. depressus</i>										
58. <i>O. orientalis</i>										
59. <i>Carpathica calophana</i>										
60. <i>Zonitoides nitidus</i>										

Продолжение таблицы I

Виды и подвиды	Леса юго-западного макроп склона				Леса северо-восточного макроп склона							
	предгорья		нижний пояс	верхний пояс	растительность субальпийского пояса		верхний пояс	нижний пояс				
	Закарпатья	Прикарпатья	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61. <i>Deroferas rodnae</i>												
62. <i>D. moldavicum</i>												
63. <i>D. occidentale</i>												
64. <i>Lehmannia marginata</i>												
65. <i>L. macroflagellata</i>												
66. <i>Limax cinereoniger</i>												
67. * <i>L. bielzii</i>												
68. <i>Bielzia coerulans</i>												
69. <i>Bradybaena fruticum</i>												
70. * <i>Plicuteria lubomirskii</i>												
71. <i>Trichia hispida</i>												
72. * <i>T. villosula</i>												
73. <i>T. bielzii</i>												
74. <i>Edentiella bakowskii</i>												
75. <i>Perforatella bidentata</i>												
76. <i>P. dibothrion</i>												
77. <i>Monachoides vicina</i>												
78. <i>Pseudotrichia rubiginosa</i>												
79. <i>Prostenomphalia carpathica</i>												
80. <i>Faustina faustina</i>												
81. <i>Arianta arbustorum</i>												
82. <i>A. aethilops petrii</i>												
83. <i>Isognomostoma isognomostoma</i>												
84. <i>Drobacia banatica</i>												
85. <i>Helix pomatia</i>												
Всего видов и подвидов	30	57	58	51	28	20	29	54	56	61		
эндемиков	5	21	23	16	12	11	13	19	21	20		
среднеевропейских горных	2	10	8	8	4	2	4	8	8	9		
европейских лесных	12	19	20	20	7	4	7	19	21	21		
палеарктических и голоарктических	11	6	7	7	5	3	5	8	6	11		
эвксинских				1								

Примечания. В табл. 1 и 2 даны следующие обозначения: 1 и 10 — леса из обыкновенного дуба; 2 — из скального дуба; 3 — буковые леса; 4 и 8 — елово-пихтово-буковые; 5 и 7 — еловые; 9 — пихтово-буковые; 6 — растительность субальпийского пояса; звездочкой обозначены виды и подвиды с локальным распространением и указаны для тех типов леса, где они обнаружены; вопросительным знаком отмечено распространение в Закарпатье видов, известных по литературным данным (Traxler, 1894).

различной вертикальной приуроченностью — отдельные субинтерзональные (табл. 1: № 4) и интерзональные моллюски (№ 21, 28, 30, 38, 41, 43), полувысокогорные, boreальные и некоторые равнинные виды (№ 5, 9, 10, 36, 44). Ближе к предгорьям во влаголюбивых малакокомплексах выпадают boreальные и частично полувысокогорные виды (№ 13, 15, 39, 54, 81), но появляется больше равнинных (№ 12, 35, 60, 71, 75).

Малакокомплексы верхнего лесного пояса представлены рядом характерных видов (табл. 1: № 23, 46, 63, 79, 82). Нередко некоторые из них (№ 23, 46, 63) населяют также смешанные леса, образуя переходные малакокомплексы.

Малакокомплексы субальпийского пояса представляют виды и подвиды, общие с ельниками.

Степень сходства малакофауны разных типов леса продемонстрирована в табл. 2, из которой следует, что лесные малакокомплексы предгорий и нижнего лесного пояса весьма близки между собой (значения

Таблица 2. Сходство малакофауны разных типов лесной растительности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>30</b>	80	73	67	28	20	28	60	73	97
2	55	<b>57</b>	81	72	46	35	45	67	75	88
3	50	80	<b>58</b>	90	68	65	66	85	93	81
4	49	68	84	<b>51</b>	86	80	83	96	94	78
5	28	31	44	61	<b>28</b>	100	100	89	75	46
6	16	18	33	45	<b>83</b>	20	100	85	70	40
7	27	30	44	60	98	82	29	90	76	45
8	43	65	82	91	61	46	87	<b>54</b>	91	74
9	51	74	91	90	50	37	52	89	<b>56</b>	84
10	64	85	79	71	29	20	29	70	80	<b>61</b>

Приложения. Числа по диагонали обозначают количество видов и подвидов для каждого типа лесной растительности; в нижней от диагонали половине таблицы даны значения степени общности (%) малакокомплексов, в верхней — меры включения, вычисленные соответственно по индексам Чекановского — Сберенсона и Шимкеевича — Симпсона (Песенко, 1982).

степени общности и меры включения часто превышают 50 %) из-за включения в их состав множества общих моллюсков и сравнительно небольшого числа характерных видов с узкой вертикальной приуроченностью. Значительно больше своеобразие фауны выражено в верхнем лесном поясе, где заметно выше роль высокогорных эндемиков. Малакокомплексы субальпийской растительности представляют собой обедненный вариант малакофауны ниже расположенных ельников.

Вертикальная поясность нередко нарушается локальными климатическими проявлениями и особенностями рельефа. Так, вследствие горнодолинной циркуляции воздуха и температурных инверсий, малакокомплексы широколиственных лесов поднимаются по широким долинам. Напротив, полувысокогорные и бореальные виды опускаются даже в полосу широколиственных лесов, где обитают во влажных местах возле ручьев и потоков, узких долин и межгорий. Вдали от равнины, куда теплые воздушные массы не проникают, в узких и глубоких долинах и котловинах, замкнутых со всех сторон горами, ельники и смешанные леса с высокогорными и полувысокогорными моллюсками опускаются ниже, чем в других местах Карпат. Некоторое нарушение зональности бывает связано также с экспозицией горных склонов: обычно на южных склонах теплее и суще, чем на северных. По целому ряду причин на северо-восточных макросклонах Карпат ельники и смешанные леса с их малакофауной имеют гораздо большую вертикальную ширину, чем на юго-западных макросклонах, где они выражены на самых высоких горных хребтах. Соответственно наблюдается и вертикальное перераспределение определенных групп моллюсков. Однако действие всех перечисленных причин, нарушающих вертикальную поясность постепенно уменьшается с высотой и в высокогорье проявляется слабо.

Байдашников А. А. Наземные моллюски Закарпатской области и их распространение по основным ландшафтам и растительным сообществам // Тр. Зоол. ин-та АН ССР.— 1985— 135.— С. 44—66.

Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях.— М.: Наука, 1982.— 288 с.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Андрченко Т. Л. Растительность Украины // Природа Украинской ССР. Растительный мир.— Киев : Наук. думка, 1985.— С. 130—200.

Bąkowski J. Mięczaki Galicyjskie. Odbitka z Kosmosu.— Lwow, 1885.— 103. s.

Traxler L. A Munkacs Kőrgyüéén ébő hásas csigák és kagylók rendszeres jegyzéka // Tér-mészetrájzi Füzetek.— Budapest, 1894.— 17, N 3/4.— S. 85—92.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена  
АН УССР (Киев)

Получено 23.03.87