ня больше. Структурные признаки очень развитого нервного аппарата, обнаруженные у каспийского тюленя, описаны у многих видов млекопитающих, включая человека (Пучковская, 1948).

Андреев Ф. В. Функциональная морфология глаза ластоногих // Морские млекопитающие.— М. : Наука, 1978.— С. 6—16.
Василевская Г. И. Иннервация наружной оболочки глаза некоторых дельфиновых // Млекопитающие СССР: Тез. докл. III съезда ВТО.— М., 1982.— С. 17—18.
Крылов В. И. Каспийский тюлень и его численность // Морские млекопитающие.— М. : Наука, 1984.— С. 268—276.
Пучківська Н. О. Морфологічні особливості нервів епітелію рогової оболонки // Зб. пам'яті О. В. Леонтовича (1869—1943).— К., 1948.— С. 141—149.
Jonson G. Observation on the refraction and vision of the seal eye // Proc Zool. Soc. Lond.— 1893.— 6.— P. 719—723.
Lavigne D. M., Bernholz C. D., Ronald K. Functional aspects of Pinnipedia vision // Functional anatomy of marine mammals.— London; New York; San-Francisco : Academ. Press, 1977.— P. 135—167.
Rochon-Duvigneaud A. L'oeil et la vision // Traite de zoologie. Anatomie, systematique, biologie.— Paris : Masson, 1972.— Vol. 16.— P. 607—703.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
АН УССР (Киев)

Получено 06.05.86

ЗАМЕТКИ

Желтопузик (Ophysaurus apodus (Pall) из причерноморских степей. В фондах Музея природы Харьковского университета обнаружен экземпляр желтопузика с этикеткой «Причерноморские степи, 1839 г.». Коллектор не указан, но можно предположить, что ящерицу добыл Криницкий. Самец, взрослый, L.— 435 км, L. cd.— 675, Sq. ventr.— 120, Sq. dors.— 106, L. c.— 48 мм, Lt. c.— 29,3 мм, L. c./Lt. c.— 1,66. По современным представлениям (Банников и др., 1977) в европейской части СССР желтопузики встречаются в Крыму и в Предкавказье и отсутствуют в Северном Причерноморье, откуда известен лишь один экземпляр из окр. Одессы, добытый Браунером в начале XX в. и хранящийся в Зоологическом музее Института зоологии АН УССР.— **С. В. Таращук** (Институт зоологии АН УССР, Киев).

О браконидах (Hymenoptera, Braconidae) — паразитах усачей Кавказа. *Histeromerus mystacinus* Wesm.— обнаружен на отдельных личинках *Xylosteus caucasicola* Plav. На одной личинке может развиваться до 10 и более особей браконид (материал: более 30 ♀ и 6 ♂, Краснодарский край, пос. Гузерипль, ex l., 12.1985, в древесине дуба, А. Мирошников). Самки всегда сильно преобладают над самцами. Однажды из личинки *Rhagium fasciculatum* F. вышли 104 ♀ и 8 ♂ *H. mystacinus* (Краснодарский край, пос. Гузерипль, ex l., 05.1981, в гниющей древесине бука, А. Мирошников). *Spathius rubidus* (Rossi) — выведен из личинок *Tetrops sterki* Chevr. (2 ♂ и 2 ♀, Краснодар, ex l., 17—26.04.1986, тонкие ветви ясеня, А. Мирошников). *Blacus* sp. (? *errans* Nees) — из личинки *Tetrops starki* (1 ♂ там же), *Spathius curvicaudis* Ratz.— из личинки *Phymatodes testaceus* (L.) (2 ♀. Краснодар. кр., Геленджик, ex pupa, 15.05.1986, под корой дуба, А. Мирошников). Браконилы определены С. А. Белокобыльским.— **А. И. Мирошников** (Краснодарская станция защиты леса).