

УДК 595.773.4

В. А. Корнеев

## НОВЫЙ ВИД МУХ-ПЕСТРОКРЫЛОК РОДА CHETOSTOMA (DIPTERA, TEHRITIDAE) ИЗ АРМЕНИИ

Среди материалов, собранных В. М. Ермоленко, обнаружен ранее не известный вид, описание которого приводится ниже. Составлена определительная таблица видов рода, известных в фауне СССР.

*Chetostoma Rondani*, 1856

Типовой вид — *Chetostoma curvinerve Rondani*, 1856, по первоначальному обозначению.

Род принадлежит к трибе *Tryptini* подсемейства *Tryptinae* и характеризуется наличием 7—9 пар крепких черных перистомальных щетинок, опыленной среднеспинки, щитка без темных пятен, dc, расположенных на линии передних sa, 2 mspl и ta, расположенной дистальнее средины ячейки D.

В составе рода ранее было известно 6 палеарктических видов (Zia, Chép, 1938; Родендорф, 1955; Рихтер, 1965; Foote, 1984), а также 2 неарктических: *Ch. rubidum* (Coquilletti) (= *Ch. elizabethae* Quisenberry) из Колорадо, *Ch. californicum* (Blanc) из Калифорнии и 3 ориентальных: *Ch. miraculosum* (Herring) из Северной Бирмы, *Ch. admirandum* (Herring) из южного Китая и *Ch. interruptum* Hardy из Непала; библиография в каталогах Фута и Гарди (Foote, 1975; Hardy, 1977). Из состава рода следует удалить один вид из Непала, поместив его в следующей комбинации: *Chaetostomella completa* (Карог, Malala, Kamala Ghosh, 1979) comb. n.; у этого вида, согласно описанию, черное пятно на вершине щитка и типичный для последнего рода рисунок крыла.

Виды рода *Chetostoma*, для которых изучен образ жизни, связаны с жимолостью: *Ch. continuans* Zia обитает в плодах *Lonicera maackii* Rupr. и *L. ruprechtiana* Rgl. (Кандыбина, 1977), *Ch. stackelbergi* Rohd.—инквилин в галлах пилильщиков на *Lonicera* sp. (А. Г. Зиновьев, устное сообщение); большинство видов рода, судя по строению яйцеклада — также инквилины. Сходное строение яйцеклада отмечено у южноамериканских видов из близкого к *Chetostoma* и *Euleia* Wilk. рода *Parastenopa* Nendel; его представители также известны как инквилины в галлах (Aczel, 1955).

### Таблица для определения видов фауны СССР и сопредельных стран\*

1(2).	Интеркалярная полоска, идущая от средины ячейки $R_1$ к ta, не изолирована от остального рисунка . . . . .	3
2(1).	Интеркалярная полоска слита с суббазальными желтыми перевязями и пятнами . . . . .	9
3(4).	Преапикальная перевязь, идущая от вершины ячейки $R_1$ через tp, сплошная** . . . . .	5
4(3).	Преапикальная перевязь прервана в $R_5$ . . . . .	7
5(6).	Среднеспинка и плевры желтые, лишь постнотум с парой черных пятен; брюшко желто-красное. 4,0—С. Китай (Ю.-З. Шаньси) . . . . .	<i>Ch. continuans</i> (Zia)
6(5).	Среднеспинка черная, сероопыленная, плевры бурье, постнотум целиком черный; брюшко черное. 4,0—5,0—Япония (о. Хонсю) . . . . .	<i>Ch. mundum</i> (Ito)
7(8).	Апикальная перевязь, идущая от вершины $r_{2+3}$ к вершине крыла, сплошная. Среднеспинка красновато-желтая; постнотум желтый, с буроватой срединной полосой. 6,0—8,0—Великобритания, горы Центральной и Южной Европы, (?)	

\* Виды, распространенные за пределами Палеарктики, помещены в сносках; *Ch. continuans* и *Ch. mundum* включены на основании первоописаний.

\*\* Сюда относятся также *Ch. miraculosum*, *Ch. admirandum* и *Ch. interruptum*.

- Израиль; Средняя Азия (Узбекистан) . . . . . *Ch. curvinerve* Rond.  
 = *Ch. giraudi* Fr. fld.: Hendel, 1927; Корнеев, 1983).
- 8(7). Апикальная перевязь прервана посредине ячейки  $R_3$ . Среднеспинка буровато-желтая. Постнотум желтый, иногда с парой черных пятен посередине. 5.5.—Приморский край . . . . . *Ch. melliculum* (Richter)
- 9(10). Преапикальная перевязь, идущая от вершины ячейки  $R_1$  через тр., широко прервана в ячейке  $R_3$  . . . . . 11
- 10(9). Преапикальная перевязь сплошная \*. 5.5.—Ленинградская обл. . . . . *Ch. stackelbergi* (Rohdendorf)
- 11(12). Апикальная перевязь, идущая от вершины  $r_{2+3}$  к вершине крыла, доходит лишь до средины ширины ячейки  $R_5$ . 5.8.—Армения . . . . . *Ch. ermolenkoi* Когпевуев sp. n.
- 12(11). Апикальная перевязь доходит до тп. \*\*. 5.5.—Хабаровский, Приморский край; Северо-Восточный Китай (Ляонин) . . . . . *Ch. dilutum* (Zia)

\* Сюда относится также *Ch. rubidum*.

\*\* Сюда относится также *Ch. californicum*.

### *Chetostoma ermolenkoi* Когпевуев, sp. n.

Материал. Голотип ♀, параптип ♀, Армения, Хосровский заповедник, 1700 м, среднегорный лесной пояс, на *Lonicera* sp., 11.V.1985 (Ермоленко) (кол. Института зоологии АН УССР).

Самка. Голова и ее придатки (рис. 1) желтые, в крепких черных щетинках; отношение длины к высоте и к ширине = 1,0 : 1,1 : 1,6. Лоб желтый, неопыленный, слабо пунктированный, в тонких светло-бурых волосках, его длина немного больше ширины. Лицо вогнутое, с неясными усиковыми ямками; его высота чуть больше расстояния между передними краями глаз. Антennы буровато-красные, 1-й и 2-й членики в крепких черных волосках; 3-й членик в тончайшем и очень коротком светлом опушении; его длина в 1,75 раза больше ширины; ариста коротко опушена, черная, за исключением основания. Глаза в очень редких, коротких волосках. Перистомалии кпереди от щечной щетинки с рядом из 9—11 крепких, но не очень длинных щетинок по краю и 5—7 щетинковидными волосками над ними. Высота щек у нижнего края глаза составляет 1/4 высоты последнего; сзади от самой длинной щечной щетинки, щеки несут еще 6-8 черных щетинок, немногим более тонких и коротких, чем перистомальные, а также многочисленные тонкие и длинные светло-бурые волоски, заходящие на защеки и затылок. У заднего края глаза 10-12 заглазничных (ро) щетинок. Все щетинки головы черные; хетотаксия обычная для рода.

Грудь красновато-желтая, в тонком светло-сером опылении, коротких и редких черных волосках и черных щетинках. Среднеспинка с 4-5 неотчетливыми темными полосами в передней части, стерноплевры, гипоплевры и постнотум посередине с большими черными пятнами, постнотум блестящий. Щиток треугольный, чуть выпуклый, неопыленный, чуть пунктированный и блестящий, с 4 длинными черными scut и немногочисленными (6-8 пар) темными волосками по краям в основании. Плевры с 2 черными mspl, одной stpl, одной ptpl и многочисленными тонкими светло-бурыми волосками на проплеврах, мезоплеврах и птероплеврах, остерноплевры внизу в черных волосках; очень короткие и тонкие волоски на плевротергитах.

Ноги желтые, в густых черных волосках. Задние бедра с 6-7 более длинными предвершинными волосками дорсально.




Рис. 1. *Chetostoma ermolenkoi* sp. n., голова, с.в.в.




Рис. 2. *Chetostoma ermolenkoi* sp. n., детали строения:  
1 — правое крыло, сверху; 2 — яйцеклад, сбоку.

Крылья (рис. 2, 1) прозрачные, с желто-бурым рисунком. Жилка  $r_1$ , помимо волосков сверху, несет у вершины снизу 3-4 волоска;  $r_{4+5}$ , кроме 5-6 волосков сверху, с одним волоском снизу, у развилки. Грудная и крыловая чешуйки бело-кремовые, с густой белой бахромой. Жужжалыца желтые.

Брюшко буровато-красное (у живых особей ярко-красное), блестящее, в черных волосках и с длинными черными маргинальными щетинками; 6-й тергит в 1,8 раза короче 5-го и в 1,2 раза короче основного членика яйцеклада. Дорзальные и вентральные пары склеротизованных тяжей 8-го сегмента сливаются, образуя мощные ретракторы яйцеклада; его вершинный членик уплощен с боков и слабо зазубрен (рис. 2, 2).

Длина тела 6,5—6,8 мм, длина крыла 5,7—5,9 мм.

Самец, преимагинальные стадии и образ жизни неизвестны.

Вид назван именем В. М. Ермоленко.

- Кандыбина М. Н. Личинки плодовых мух-пестрокрылок (Diptera, Tephritidae).—Л.: Наука, 1977.—212 с.
- Корнеев В. А. *Chetostoma giraudi* Frfld.—новый для фауны СССР вид мух-пестрокрылок (Diptera, Tephritidae) // Вестн. зоологии.—1983.—№ 3.—С. 45.
- Рихтер В. А. Новые мухи-пестрокрылки (Diptera, Trypetidae) в фауне СССР // Зоол. журн.—1965.—44, № 1.—С. 136—137.
- Родендорф Б. Б. Новые мухи-пестрокрылки (Diptera, Trypetidae) палеарктической фауны // Тр. Зоол. ин-та АН СССР.—1955.—18.—С. 325—327.
- Aczel M. The genus *Parastenopa* Hendel // Wassman J. Biol.—1955.—N 13.—P. 167—187.
- Foote R. H. Family Tephritidae // A Catalog of the Diptera of America North of Mexico.—Washington, D. C.: Smithsonian Inst. Press, 1965.—P. 658—678.
- Foote R. H. Family Tephritidae (Trypetidae) // Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 9: Microppezidae—Agromyzidae.—Budapest: Acad. Kiadó, 1984.—P. 66—149.
- Hardy D. E. Family Tephritidae // A Catalog of the Diptera of the Oriental Region. Vol. III. Suborder Cyclorrhapha (excluding Division Aschiza).—Honolulu: Univ. Honolulu Press, 1977.—P. 44—134.
- Hendel F. 49. Fam. Trypetidae // Lindner E./ Ed. Die Fliegen der palaearktischen Region.—Suttgart: E. Schweizerbart'sche Verl., 1927.—221 S.

Kapoov V. C., Malla Y. K., Kamla Ghosh. On a collection of fruit flies (Diptera: Tephritidae) from Kathmandu Valley, Nepal // Orient. Insects.— 1979.— 13, N 1/2.— P. 81—85.

Zia Y., Chen S. H. Trypetidae of North China // Sinensia.— 1938.— 9, N 1/2.— 180 p.

ВНИИ биологических методов  
защиты растений (Кишинев)

Получено 30.05.88

#### A New Species of the Genus Chetostoma (Diptera, Tephritidae) from Armenia.

Korneyev V. A.— Vestn. zool., 1990, No 1.— *Ch. ermolenkoi* sp. n. is described after two female specimens from Khosrov Nature Reserve. It differs from all known species in the wing pattern. Type material is deposited in the Schmalhausen Institute of Zoology (Kiev). A key to species known to occur in the USSR and bordering countries is given.

УДК 598.113.7

Н. Н. Щербак, С. И. Ахметов

### СИСТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЛИНОНОГОГО СЦИНКА — EUMECES SCHNEIDERI (SAURIA, SCINCIDAE)

Синонимика и история изучения данного вида достаточно подробно представлены в работе Тейлора (Teylor, 1935). В соответствии со взглядами указанного автора в роде *Eumeces* выделена группа "*schneiderii*". В нее автор включил ряд близких видов, распространенных в Северной Африке и Западной Азии: *E. schneideri*, *E. princeps*, *E. pavimentatus*, *E. zarudnyi* и *E. algeriensis* (с двумя формами — номинативной и *E. a. meridionalis*).

В последующие годы систематика круга форм *E. schneideri* была посвящена работа И. Айзельта (Eiselt, 1940), в которой автор критиковал таксономию Тейлора и рассматривал указанные выше виды (за исключением *E. zarudnyi*, который не упоминается в определительных таблицах) в качестве четких подвидов (*E. sch. algeriensis*, *E. sch. meridionalis*, *E. sch. pavimentatus*, *E. sch. princeps*).

Несколько иные взгляды относительно географических форм длинноногого сцинка высказывал Р. Мертенс (Mertens, 1920, 1946). Он подчеркивал, что родственные формы *E. schneideri* часто переходят одна в другую и рассматриваются как географические викарианты, подвиды одного вида. В качестве номинативной формы рассматривается популяция, обитающая на Кипре. В числе подвидов, кроме упомянутых выше, приводится *E. sch. blythianus*, *E. sch. zarudnyi*, *E. sch. aldrovandii*.

В определителе земноводных и пресмыкающихся фауны СССР (Определитель..., 1977) в целом принята внутривидовая система Р. Мертенса (Mertens, 1946), подчеркивается, что на территории СССР обитает форма *E. sch. princeps*, а также приводится в качестве валидного подвид *E. sch. variegatus*, распространенный в Юго-Западном Иране; различается 7 форм длинноногого сцинка. Подобная точка зрения отражена и в «Руководстве по пресмыкающимся Европы» (Darevskij, 1981) и высказано мнение о видовой самостоятельности марокканско-западно-алжирских длинноногих сцинков. Однако работы, утверждающие это обстоятельство, нам неизвестны.

В каталоге европейских и югозападноазиатских пресмыкающихся (Welch, 1983) фигурирует только шесть форм *E. schneideri*, в их числе не рассматривается *E. schneideri algeriensis*.

Таким образом, по современным представлениям различают 6—7 подвидов длинноногого сцинка, а статус *E. algeriensis* требует дальнейшего обоснования. Географическая изменчивость длинноногих сцинков на территории СССР не изучалась. Указанные вопросы и являются целью настоящего исследования. Представленная работа выполнялась в Зоологическом музее Института зоологии АН УССР (Киев), в работе использованы коллекции и собственные сборы, которые хранятся в указанном музее.