

УДК 595.773.4

А. Л. Озеров

НОВЫЕ ВИДЫ ДВУКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВ MICROPEZIDAE, PIOPHILIDAE И CARNIDAE (DIPTERA) ИЗ СССР

При изучении Micropezidae, Piophilidae и Carnidae в коллекции Зоологического музея Московского университета было выявлено 6 новых видов. Ниже следуют их описания. Типы новых видов хранятся в коллекции Зоомузей МГУ (Москва).

Сем. Micropezidae

Micropeza (Protyleos) soosi Oze rov, sp. n. (рис. 1, 1—3)

М атериал. Голотип ♂, Южное Приморье, Хасанский р-н, Рязановка, 11.06.1989 (Шаталкин). Паратипы: 2 ♀, там же; ♂, Амурская обл., г. Зея, 14.07.1981 (Озеров).

С ам ец. Голова конически вытянута вперед; длина головы на 1/3 больше, чем высота. Верх лба и затылок черные, с тусклым блеском. Низ лба, щеки и лицо грязно-желтые, в сером или серебристом налете. Гла-за округлые. Щупики желтые. 1-й и 2-й членики усиков темно-коричневые или черные; 3-й членик овальный, грязно-желтый с затемнением по переднему краю. Ариста коричневая, голая.

Грудь черная с тусклым блеском. Одна нотоплевральная щетинка. Капэпистерны с одной сильной щетинкой на верхнем крае, снизу в густых длинных черных волосках. Ноги желтые. Тазики всех ног белые. Передняя сторона тазиков задних ног в длинных черных волосках. Вершинная половина или треть передних бедер, передние голени, основание и вершина средних и задних голеней, лапки всех ног черные. У самца средние голени на передней стороне у основания с торчащими волосками. Базальная треть (у самцов) или четверть (у самок) задних бедер на задней поверхности в торчащих волосках. Длина волосков у самцов примерно в 2 раза больше толщины задних бедер, у самок примерно в 2 раза меньше толщины бедер. Крыло затемнено, с черными жилками. Жужжальца желто-коричневые.

Брюшко полностью черное, с тусклым блеском. V стернит самца с тонкими клещевидно изогнутыми палочковидными боковыми отростками, усаженными длинными черными щетинками (рис. 1, 2). Основание V стернита слабо расширено. Сурстили широкие, на вершине раздвоены (рис. 1, 1). VII тергит самки сверху с почти параллельными боковыми краями, в нижней трети суживающийся; сбоку — утолщен дорсовентрально, с небольшим изгибом в середине (рис. 1, 3а, 3б).

Длина тела 5,4—6,5 мм. Длина крыла 3,6—4,4 мм.

Д и ф ф е р е н ц и а л ы й д и а г н о з. Близок к единственному палеарктическому виду подрода *Protyleos* — *M. (Protyleos) pilifemur* Soós из Монголии (Soós, 1975). Отличия следующие:

M. (Protyleos) soosi sp. n.

1. 1-й и 2-й членики усиков темно-коричневые или черные.
2. V стернит брюшка самца слабо расширен в основании, его отростки с длинными щетинками (рис. 1, 2).

M. (Protyleos) pilifemur Soós

1. 1-й и 2-й членики усиков желтые до желто-коричневых.
2. V стернит брюшка самца сильно расширен в основании, его отростки с короткими щетинками (Soós, 1975, fig. 18—19).

З а м е ч а н и я. Вид назван именем д-ра А. Шооша (Dr. A. Soós, Hungary), внесшего заметный вклад в изучение микропезид Палеарктики.




Рис. 1. Детали строения *Micropeza (Protylos) soosi* sp. н. (1–3) и *Meoneura krievsheinae* sp. н. (4–5): 1, 5 — эпандрий и сурстиль, сбоку; 4 — то же, сверху; 2 — V стернит брюшка самца; 3 — VIII тергит брюшка самки: а — сбоку, б — сверху.

Сем. Piophilidae

Allopiophila caucasica, Озегов, sp. н.

Материал. Голотип ♀, Кавказ, Сев. Осетия, окр. пос. Бурон (Цейское ущелье), 5.07.1990 (Озеров).

Самка. Голова коричневато-желтая с небольшими, заходящими на затылок темно-коричневыми пятнами вокруг офтальм. Лоб ниже глазкового треугольника в черных, направленных вперед волосках. Ширина лба примерно равна длине. Глазковый треугольник темно-коричневый, глазки коричневато-желтые. Лицо с очень слабо выступающим килем. Щеки широкие, их ширина составляет 2/3 высоты глаза. Хетотаксия головы: 2 ог (передняя чуть слабее задней, обе направлены кнаружи), рос, ос, о офтальм, 1 офтальм, одна пара вибрисс, низ затылка с 2 щетинками. Передняя орбитальная щетинка такой же длины и толщины, как щетинки на затылке, и примерно в 2 раза тоньше и короче других щетинок головы (исключая заднюю ог). Усики и ариста коричневато-желтые. 3-й членник усиев с наружной стороны у основания аристы частично затемнен. Ариста в коротких прилегающих волосках.

Мезонотум преимущественно блестяще-черный, в тонких коротких волосках. Плечевые бугорки, нотоплевры, супрааллярная область, пост-аллярный бугорок и часть мезонотума по границе с ними коричневато-желтые. Катэпимероны, мероны и катэпистерны блестяще-черные. Ка-

татергиты и анатергиты черные, в сером налете. Проэпистерны и низ анэпистерн под передним дыхальцем в слабом беловатом налете. Хетотаксия груди: 1 rrgp, 2 npl, 2 spal, 1 pal, 1 dc, 1 prepst, 2 kepst. Щиток голый, блестяще-черный, коричневатый по краям, с двумя парами щетинок: 1 b и 1 ap. Ноги желтые. Нижняя половина передних голеней, передние лапки полностью и два последних членика лапок средних и задних ног черные. Бедра передних ног в передней трети с большим черным пятном на антеровентральной поверхности. Бедра задних ног с большим черным пятном у вершины на верхней стороне. Крылья прозрачные со светло-коричневыми жилками. Вершинная треть Sc, костальная жилка между Sc и R₁, средняя часть R₁ и мембрана между указанными выше отрезками жилок сильно затемнены. Крыловая и закрыловая чешуйки, их каймы и жужжальца светло-желтые.

Брюшко блестяще-черное, в многочисленных тонких коротких волосках.

Длина тела 3,5 мм. Длина крыла 3,7 мм.

Самец неизвестен.

Дифференциальный диагноз. До сих пор в роде *Alloriophila* было известно два вида: голарктический — *A. luteata* (Halidaiy) и североамериканский — *A. testacea* (Melandier) (McAlpine, 1977). Новый вид наиболее похож на *A. luteata*. Все три вида можно различить следующим образом:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Мероны, катэпимероны, кататергиты, анатергиты, брюшко желтые | <i>A. testacea</i> (M el.) |
| — Мероны, катэпимероны, кататергиты, анатергиты, брюшко черные | 2 |
| 2. Затылок за глазковым треугольником, верх плечевых бугорков, нотоплевры, супрааллярная область, посталирный бугорок, катэпистерны, анэпистерны коричневато-желтые | <i>A. caucasica</i> sp. p. |
| — Затылок за глазковым треугольником, мезонотум, исключая низ плечевых бугорков, катэпистерны, анэпистерны черные | <i>A. luteata</i> (Hal.) |

Сем. Carnidae

Meoneura arctica O z e g o v , sp. p. (рис. 2, 7, 8)

Материал. Голотип ♂, п-ов Ямал, р. Шучья, устье р. Хей-яха, 26.07.1984 (Басихин). Паратип: ♂ с такой же этикеткой, как голотип.

Самец. Лоб, глазковый треугольник, скулы, лицо, щеки блестяще-черные. Передняя треть лба желто-красная. Лобный треугольник достигает фронтальных щетинок. Граница лобного треугольника нечеткая. Ширина щек под глазом чуть более 1/3 длины вертикального диаметра глаза. Хетотаксия нормальная. Усики черные.

Грудь, включая щиток, черная, в зеленовато-сером налете. 4 дорсоцентрализованные щетинки. Ноги черные. Передние бедра с 3 длинными рв. Крылья коричневатые, с коричневыми жилками. Крыловая и закрыловая чешуйки и их каймы сильно затемнены. Жужжальца коричневые.

Брюшко блестяще-черное в очень слабом сероватом налете. Гениталии как на рис. 2, 7, 8. Эпандрий узкий. Сурстили неправильной треугольной формы. Ламеллы прямоугольные, с рядом из 5—6 сильных щетинок.

Длина тела 1,8—1,9 мм. Длина крыла 1,5 мм.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. Новый вид наиболее близок к *M. minutissima* (Zitt.) и отличается следующими признаками:

- | | |
|---|--|
| <i>M. arctica</i> sp. p. | <i>M. minutissima</i> (Zitt.) |
| 1. Мезонотум в плотном налете. | 1. Мезонотум тусклоблестящий. |
| 2. Крылья коричневатые с коричневыми жилками. | 2. Крылья беловатые с бледно-желтыми жилками. |
| 3. Ламеллы с 5—6 щетинками. | 3. Ламеллы с 1 щетинкой. |
| 4. Сурстили треугольные. | 4. Сурстили скорее ромбовидные, чем треугольные (Collin, 1930, fig. 5) |




Рис. 2. Детали строения *Meoneura* spp.: 1—3 — *M. maritima* sp. n.; 4 — *M. prima* Вескег; 5—6 — *M. caucasica* sp. n.; 7—8 — *M. arctica* sp. n.; 1, 5, 7 — эпандрий и сурстиль, сбоку; 2, 6, 8 — то же, сверху; 3, 4 — сурстиль, сбоку.

Meoneura caucasica О з е г о в, sp. н. (рис. 2, 5, 6)

Материал. Голотип ♂, Кавказ, Сев. Осетия, окр. г. Алагира, 12.06.1989 (Озеров).

Самец. Передняя половина лба кирпично-красная. Задняя половина лба, лобный треугольник, щеки черные, в плотном серо-зеленом налете. Низ лица черный. Лобный треугольник составляет 4/5 длины лба и не достигает фронтальных щетинок. Вершина лобного треугольника закруглена. Ширина щек под глазом составляет около 1/3 длины вертикального диаметра глаза. Хетотаксия нормальная. Усики черные. 2-й членник красноватый.

Грудь черная в плотном серо-зеленом налете. Только одна дорсоцентальная щетинка имеется. Ноги черные. Лапки средних и задних ног светло-коричневые. Бедра передних ног с двумя длинными ру. Крылья беловатые со светло-коричневыми жилками. Крыловая и закрыловая чешуйки и их кант затемнены. Жужжалыца белые.

Брюшко черное в плотном серо-зеленом налете. Гениталии как на рис. 2, 5, 6. Эпандрий с одной парой сильных щетинок. Сурстили палочковидные, слегка утолщены в основании, на вершине закруглены, без длинных щетинок. Ламеллы отсутствуют.

Длина тела 1,6 мм. Длина крыла 1,3 мм.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. *M. caucasica* sp. p. близок к *M. granadensis* Lyneborg (Lyneborg, 1969). В отличие от нового вида у *M. granadensis* грудь блестяще-черная, без налета, крылья не молочно-белые, а эпандрий с несколькими парами сильных щетинок.

Meoneura krivosheinae Ozegov, sp. p. (рис. 1, 4, 5)

Материал. Голотип ♂, Таджикистан, окр. Джиликуля, заповедник «Тигровая балка», 20.11.1968 (Кривошенин). Паратипы: 4 ♂, 6 ♀ с такими же этикетками.

Самец. Передняя половина лба желтая. Задняя половина лба бархатисто-черная. Лицо и скулы черные. Щеки блестяще-черные в сероватом налете. Лобный треугольник блестяще-черный, чуть больше половины длины лба. Ширина щек под глазом равна 1/3 длины вертикального диаметра глаза. Хетотаксия нормальная. Усики бархатисто-черные.

Грудь блестяще-черная, в едва заметном сероватом налете. Щиток в плотном сером налете. 3 дорсоцентральные щетинки имеются. Ноги черные. Передние бедра с 4 сильными рв. Крылья коричневатые, со светло-коричневыми жилками. Крыловая и закрыловая чешуйки и их кант коричневатые. Жужжальца желтые.

Брюшко блестяще-черное. Эпандрий и сурстили как на рис. 1, 4, 5. Ламеллы отсутствуют.

Длина тела 1,7—1,9 мм. Длина крыла 1,7—1,8 мм.

Дифференциальный диагноз. По строению гениталий новый вид наиболее близок к *M. alpina* Hennig (Hennig, 1948), однако имеет только 3 дорсоцентральные щетинки, тогда как у *M. alpina* их 4.

Замечания. Вид назван именем диптеролога Марины Геннадьевны Кривошениной, собравшей все экземпляры этого вида.

Meoneura maritima Ozegov, sp. p. (рис. 2, 1—3)

Материал. Голотип ♂, Южное Приморье, Лазовский р-н, окр. Лазо, 28.08.1987 (Озеров). Паратипы: 2 ♂ с такой же этикеткой, как голотип.

Самец. Передняя половина лба красно-коричневая. Задняя половина лба, лицо, скулы, щеки черные, в легком налете. Лобный треугольник блестяще-черный, немного заходит за середину лба. Ширина щек под глазом равна половине длины вертикального диаметра глаза. Хетотаксия нормальная. Усики угольно-черные.

Грудь черная в слабом сером налете. 3 дорсацентральные щетинки имеются. Ноги черные. Передние бедра с одной длинной рв. Крылья коричневатые, с коричневыми жилками. Крыловая и закрыловая чешуйки светлые, их кант затемнены. Жужжальца желтые.

Брюшко блестяще-черное. Гениталии как на рис. 2, 1, 2. Сурстили очень сильно расширены в основании (рис. 2, 3). Ламеллы прямоугольной формы с закругленными углами, с длинными и короткими щетинистыми волосками.

Длина тела 1,8—2,0 мм. Длина крыла 1,5—1,6 мм.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. Вид близок к *M. prima* (Becker) и *M. pseudoseducta* L. Papp. От *M. pseudoseducta* новый вид и *M. prima* отличаются наличием на передних бедрах только 1 рв. У *M. pseudoseducta* 2—3 рв. Отличия *M. maritima* sp. p. и *M. prima* следующие:

M. maritima sp. p.

1. Мезонотум в слабом сером налете.
2. Сурстили в основании сильно утолщены (рис. 2, 3).

M. prima (Becker)

1. Мезонотум в плотном серо-зеленом налете.
2. Сурстили в основании утолщены не значительно (рис. 2, 4).

- Collin J. E.* Some species of the genus *Meoneura* (Diptera) // Entomol. month. Mag.—1930.—66.—P. 82—89.
Hennig W. Eine neue Art der Gattung *Meoneura* aus den Niederen Tauern (Diptera, Milichiidae) // Z. Wiener Entomol. Ges.—1948.—33.—S. 138—139.
Lyneborg L. Some Micropezidae, Psilidae, Platystomidae, Otitidae, Pallopteridae, Odiniidae, Aulacigasteridae, Asteidae and Milichiidae (Diptera) collected in Southern Spain, with description of six new species // Entomol. Meddel.—1969.—37.—P. 27—44.
McAlpine J. F. A revised classification of the Piophilidae, including "Neottiophilidae" and "Thyreophoridae" (Diptera, Schizophora) // Mem. Entomol. Soc. Canada.—1977.—N 103.—P. 1—66.
Soós A. Taxonomische und Faunistische Untersuchungen über die Mongolischen Micropeziden (Diptera) // Acta Zool. Acad. Sci. Hung.—1975.—21, N 1/2.—S. 181—194.

Зоологический музей МГУ
(103009 Москва)

Получено 10.10.90

Нові види двокрилих родин Micropezidae, Piophilidae та Carnidae (Diptera) з СРСР.
Озеров А. Л.—Вестн. зool., 1991, № 6.—За матеріалами колекції Зоологічного музею Московського університету описано 6 нових видів: Micropezidae—*Micropeza (Protylos) soosi* sp. n. (Далекий Схід); Piophilidae—*Allopiophila caucasica* sp. n. (Кавказ, Півн. Осетія); Carnidae—*Meoneura arctica* sp. n. (півострів Ямал), *M. caucasica* sp. n. (Кавказ, Півн. Осетія), *M. krivosheinae* sp. n. (Таджикистан), *M. maritimae* sp. n. (Далекий Схід).

New Species of Micropezidae, Piophilidae and Carnidae (Diptera) from the USSR.
Ozerov A. L.—Vestn. zool., 1991, N 6.—Six new species are described on materials deposited in collections of the Moscow University Zoological Museum: Micropezidae—*Micropeza (Protylos) soosi* sp. n. (Far East); Piophilidae—*Allopiophila caucasica* sp. n. (Caucasus, N. Osetia); Carnidae—*Meoneura arctica* sp. n. (Yamal peninsula), *M. caucasica* sp. n. (Caucasus, N. Osetia), *M. krivosheinae* sp. n. (Tadzhikistan), *M. maritimae* sp. n. (Far East).

УДК 595.422(477)

П. Г. Балан

НОВЫЕ ВИДЫ КЛЕЩЕЙ РОДА ZERCON (ACARI, MESOSTIGMATA) ИЗ ГОРНОГО КРЫМА

При обработке материала, собранного сотрудниками отдела акарологии Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН Украины и Львовского государственного научно-природоведческого музея АН Украины, были обнаружены новые виды, описание которых приводится ниже. Голотипы описываемых в статье видов хранятся в Институте зоологии АН Украины; паратипы — в Киевском университете.

Zercon asymmetricus Balan, sp. n.

Голотип ♀ (длина тела 0,49, ширина 0,39 мм), препарат НВZ-7, Крым, Бахчисарайский р-н, г. Ай-Петри, подстилка в грабовом лесу, 8.10.1979 (Сергиенко). Паратипы: 4 ♀, там же, тогда же.

С а м к а. Длина тела 0,47—0,49, ширина 0,37—0,39 мм. Дорсальная сторона (рис. 1). На переднем дорсальном щите щетинки i1 слабо определены, как и маргинальные щетинки серии г, остальные — гладкие. Щетинки i6 и z2 своими вершинами доходят, а s6 — заходят за задний край щита. Длина щетинок переднего дорсального щита (мкм):

i1—31—34	z1—20—23	s1—13—14	r1—20—23
i2—16	z2—17—20	s2—14—16	r2—26—27
i3—23		s3—18—20	r3—40—43
i4—23		s4—26—29	r4—40—43
i5—21—23		s5—23—26	r5—40—43
i6—20—21		s6—29—31	r6—43—46

© П. Г. БАЛАН, 1991