

- Громов И. М., Поляков И. Я. Полевки (Microtinae).— Л.: Наука, 1977.— 504 с.— (Фауна СССР. Млекопитающие; Т. 3. Вып. 8).
- Несин В. А., Топачевский В. А. Древние этапы эволюции полевковых (Rodentia, Microtinae) // Вестн. зоологии.— 1991.— № 6.— С. 41—46.

Институт зоологии АН Украины  
(252601 Киев)

Получено 10.12.90

Нова триба вимерлих хом'якоподібних *Ischymomyini* (Rodentia, Cricetidae). Несин В. А., Топачевський В. О.— Вестн. зоол., 1992, № 1.— Для роду *Ischymomys*, який раніше відносився до підродини полівкових (Microtinae), встановлено самостійну трибу в підродині Cricetinae. Проведено порівняння з полівковими та можливими предковими таксонами хом'якоподібних.

A New Tribe of Extinct Cricetids *Ischymomyini* (Rodentia, Cricetidae). Nesin V. A., Topachevsky V. A.— Vestn. zool., 1992, N 1.— A new tribe is established for the genus *Ischymomys*, transferred from Microtinae to Cricetinae. It is compared with voles and possible ancestral taxa within Cricetidae.

## ЗАМЕТКИ

Редкие и малоизвестные виды голубянок (Lepidoptera, Lycaenidae) из Средней Азии.— *Plebejus (Kretania) eurypilus* (Freyer): ♂, Таджикистан, хр. Хозратишох, 30.06.1989, колл. Е. Тарасова (колл. ИЗАНУ); ближайшие известные местонахождения — хр. Копетдаг (Туркмения) и Афганистан; для Таджикистана приводится впервые. *Freyeria trochilus* (Freyer): ♂, Таджикистан, Рушанский хр., кишл. Шидз, 1950 м, 07.1987, С. Чуркин (колл. В. Чиколовца; далее — ВЧ); впервые отмечен для Памира и на высотах более 1000 м; в Средней Азии встречается в пустынях и полупустынях, предгорьях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. *Polyommatus pulchrus* Sheljuzhko: 2♂, 2♀, Таджикистан, Дарвазский хр., пер. Хабу-Работ, 3500 м, 06.08.1989, В. Чиколовец (ВЧ); встречается на высотах 2000—4000 м на Юго-Западном и Центр. Памире и в Афганистане; для Дарвазского хр. приводится впервые; собран на мелкощепнистых склонах у гребней отрогов. *Polyommatus magnificus* Gr.-Gr.: ♂, Узбекистан, Угамский хр., кишл. Пскем, 1350 м, 08.07.1989, Г. Д. Самодуров (колл. Самодурова); ♂, Киргизия, Алайский хр., р. Шахимардан, 12.07.1935, А. Цветаев (колл. Цветаева, МГУ); 9♂, 2♀, Таджикистан, Гиссарский хр., Кондара, 15—28.06.1965, А. Цветаев (колл. Цветаева); 2♂, Таджикистан, Нурек, 17.06.1980, В. И. Маковский (колл. ИЗАНУ); ранее приводился с хребтов: Зеравшанского, Дарвазского, Петра Первого, Заалайского, Алайского; на каменистых и степных участках на высотах 1200—2500 м с мая по август. *Polyommatus avinovi* Ju. Ju. Stshetkin: 3♂, Узбекистан, зап. отрог Гиссарского хр., Мачатли, Шаргуньсай, 1800 м, 18.06.1987, В. Чиколовец (ВЧ); на влажном песке у реки недалеко от степных и щепнистых склонов со скальными обнажениями; ранее был известен из типовой местности (Таджикистан, сев. скл. хр. Петра Первого, Хазор-Чашма, 2100 м) и хр. Хозратишох (Ю. Л. Щетинин, личное сообщ.) — В. В. Чиколовец (Украинское общество охраны природы), И. Г. Плющ (Институт зоологии АН Украины).

Находка львинки *Oxycera nigricornis* в Одесской обл. Украины.— ♂, выведен 27.04.1990 из личинки, найденной 23.02.1990 в роднике урочища Комсомольского (окр. г. Балта, Одесской обл.). Личинка обнаружена среди гниющих растений на мелководье с медленным течением. Находка расширяет ареал вида, который до этого был известен из Зап. Европы: от южной Швеции до Италии и Греции.— В. В. Березовский (Одесский историко-краеведческий музей).