

New Subspecies of *Vipera lebetina cernovi* ssp. nov. (Reptilia, Viperidae) from Middle Asia.—Chikin Yu. A., Shcherbak N. N.—*Vestn. zool.*, 1992, N 6.—Description of the new subspecies of Levantine viper—*Vipera lebetina cernovi* Chikin et Szczerbak from Middle Asia is given: Holotype Re-19 is deposited in the Zoological Museum of the Institute of Zoology, Academy of Sciences of Ukraine, type territory—bank of the river Murghab in the vicinity of town Iolotan, Marijsky district, Turkmenistan. Morphological characteristics of paratypes and samples from three populations of this subspecies from the territory of Turkmenistan are provided. *V. l. cernovi* sspl nov. differs from *V. l. turanica* and *V. l. obtusa* in colouration as well as in head and body patterns, presence of large scale above the eye, number of scales on pileus and pairs of subcaudals, number of ventrals; besides the latter differs from the new subspecies in the number of teeth on dentary.

ЗАМЕТКИ

Обыкновенная жаба (*Bufo bufo*) в дельте Дуная.—Для территории румынской Добруджи долгое время единственным указанием на существование здесь *B. bufo* была находка проф. А. В. Grosu—горы Măcîn, у монастыря Cocoș (Fuhn, 1960). Это холмистая лесистая местность между городами Тулча и Брэйла несколько южнее г. Исакча. Б. Я. Киш обнаружил *B. bufo* на берегу оз. Roșca, входящего в систему озер между Килийским и Сулинским гирлами Дуная: IX.1983 обнаружен 1 ad. (Kiss, 1985), VIII.1991—около десятка juv. В. Оцел (Otel, 1992) X.1991 добыл 1 juv. в плавнях у оз. Roșu между Сулинским и Георгиевским гирлами вблизи морского побережья. Т. И. Котенко 25.06.1992 обнаружила 1 ad. (L.=79,5 мм) на берегу канала Perivolovca (соединяет Сулинское и Георгиевское гирла) в р-не оз. Isac. Биотоп—небольшой огород, окруженный водой и зарослями тростника, единичные ивы. В. Оцел VIII.1992 добыл 1 juv. на левом берегу Сулинского гирла в 3 км выше с. Maliuc. А. А. Федорченко 24.08.1992 на территории базы отдыха Lebada (левый берег Сулинского гирла против с. Cirişan) во время ночного учета амфибий отметил 2 ad. и 1 juv. на полосе длиной 600 и шириной 1 м. Таким образом, *B. bufo* обнаружена в плавневых биотопах дельты Дуная в 5 различных пунктах. Вид распространен, очевидно, на всей территории между Килийским и Георгиевским гирлами и, по-видимому, в плавнях южнее последнего. Необходимо выяснить, имеется ли эта жаба в украинской части дельты Дуная, значительно более молодой по возрасту.—Т. И. Котенко (Институт зоологии АН Украины, Киев), А. А. Федорченко (заповедник «Дунайские плавни», Вилково), В. Оцел (Институт дельты Дуная, Тулча), Б. Я. Киш (биосферный резерват «Дельта Дуная», Тулча).