

- Lebedev A. G. Einige neue *Andrena*-Arten aus S.S.S.R. // Konowia.—1933.—12, N 1/2.—S. 61—63.
 Morawitz F. F. Nachtrag zur Bienenfauna Caucasiens // Hor. Soc. entomol. Ross.—1878.—14.—S. 72—73.
 Morawitz F. F. Supplement zur Bienenfauna Turkestans // Ibid.—1894.—28.—S. 64—65.
 Осичнюк А. З. Два новых азиатских вида андрен (Hymenoptera, Andrenidae) // Вестн. зоол.—1985.—№ 3.—С. 22—23.

Институт зоологии АН Украины
 (252601 Киев)

Получено 05.02.92

НОВІ ПІДРОДИ ТА ВИДИ ПАЛЕАРКТИЧНИХ АНДРЕН (HYMENOPTERA, ANDRENIDAE). Повідомлення 2. ОСИЧНЮК Г. З.—ВЕСТН. ЗООЛ., 1993, № 5.— В роді *Andrena F.* встановлено підрид *Calcarina* subg. n., який включає 2 середньоазіатські види: *A. cochlearicalcar* і *A. laticalcar*. Описано 5 нових видів: *Andrena (Poliandrena) kryzhanovskii* sp. n., *A. (Truncandrena) zlatae* sp. n., *A. (A.) valentinae* sp. n. (Середня Азія), *A. (Holandrena) labiatula* sp. n. (Крим), *A. (Euandrena) khosrovi* sp. n. (Закавказзя). Типи зберігаються в Інституті зоології АН України (Київ), Зоологічному інституті РАН (С.-Петербург) та в Зоологічному музеї Московського університету.

NEW SUBGENERA AND NEW SPECIES OF PALAEARCTIC ANDRENA BEES (HYMENOPTERA, ANDRENIDAE). COMMUNICATION 2. Osyshnjuk A. Z.—VESTN. ZOO., 1993, N 5.— A new *Andrena F.* subgenus *Calcarina* is established to include 2 Middle Asian species: *A. cochlearicalcar* and *A. laticalcar*. 5 species are described as new: *Andrena (Poliandrena) kryzhanovskii* sp. n., *A. (Truncandrena) zlatae* sp. n., *A. (A.) valentinae* sp. n. (Middle Asia), *A. (Holandrena) labiatula* sp. n. (Crimea), *A. (Euandrena) khosrovi* sp. n. (Transcaucasia). Type material is deposited in Institute of Zoology, Ukrainian Academy of Sciences (Kiev), Zoological Institute, Russian Academy of Sciences (St.-Petersburg), Zoological Museum, Moscow University.

ЗАМЕТКИ

Необычная окраска оперения головы у большой синицы (*Parus major*).— 24.09.1992 г. в г. Кисловодске возле железнодорожного вокзала в утреннее время на близком расстоянии в стайке больших синиц наблюдали птицу с необычной окраской оперения головы: от основания клюва через черную шапочку по шее вплоть до спины проходила широкая белая полоса. Отношение других птиц стаи к описанной особи и ее поведение не отличались от обычного.— Н. А. Габер, И. А. Галинская (Институт зоологии АН Украины, Киев).